



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

**Επιδημιολογική Επιτήρηση HIV/AIDS στην
Ελλάδα**

Διαγνώσεις έως 31.12.2025

**HIV/AIDS Surveillance in Greece
Diagnoses through 31.12.2025**



**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ)
ANNUAL EDITION OF THE NATIONAL PUBLIC HEALTH ORGANIZATION (NPHO)**

Ελληνική Δημοκρατία / Υπουργείο Υγείας

Hellenic Democracy / Ministry of Health



Πρόλογος – Βασικά σημεία

- Η παρούσα ετήσια αναφορά για την Επιδημιολογική Επιτήρηση του HIV/AIDS στην Ελλάδα είναι η τρίτη που εκδίδεται από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου HIV στις 05/04/2023, σύμφωνα με το ΦΕΚ 6110/Β/30.11.2022 «Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη – Ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων, των εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης», στο οποίο μετέπεσαν τα δεδομένα που είχαν καταγραφεί έως και τις 04/04/2023 στο Αρχείο HIV του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
- Με την έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου HIV διαφοροποιήθηκε η διαδικασία καταγραφής των περιστατικών HIV και AIDS, η οποία πλέον πραγματοποιείται απευθείας από τους θεράποντες ιατρούς και τους ιατρούς των Κέντρων Αναφοράς.
- Από την ανάλυση των δεδομένων του 2025, παρατηρήθηκε μικρή ελάττωση (3,5%) των νέων διαγνώσεων συγκριτικά με τις διαγνώσεις του 2024.
- Μεταξύ των 625 περιστατικών HIV που διαγνώστηκαν στην Ελλάδα το 2025, περιλαμβάνονται 85 (13,6%) με προηγούμενη διάγνωση σε χώρα του εξωτερικού.
- Συχνότερος τρόπος μόλυνσης ήταν η σεξουαλική επαφή, κυρίως μεταξύ ανδρών (38,4% των νέων διαγνώσεων).
- Τα περιστατικά που μολύνθηκαν μέσω χρήσης ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών ελαττώθηκαν κατά 20%, συγκριτικά με το 2024.
- Παραμένει αυξημένο το ποσοστό των νέων διαγνώσεων με ακαθόριστο τρόπο μόλυνσης (34,2% των νέων διαγνώσεων).
- Το 39% των νέων διαγνώσεων είχε αλλοδαπή εθνικότητα.
- Προεξάρχουσες ηλικιακές ομάδες κατά τη διάγνωση, το τρέχον έτος, ήταν αυτές των 30-39 και 40-49 ετών.
- Το 50,8% των περιστατικών που καταγράφηκαν το 2025, διαγνώστηκε καθυστερημένα. Τα υψηλότερα ποσοστά καθυστερημένης διάγνωσης σημειώθηκαν στα ετεροφυλόφιλα άτομα (70,2%), στις γυναίκες (63,2%) και στα άτομα ηλικίας 50+ ετών (72,2%), και τα χαμηλότερα στους άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες (37,8%) και στα άτομα ηλικίας 20-24 ετών (26,1%).
- Το 2025, αν και αυξήθηκε το ποσοστό καταγραφής των CD4+ T-λεμφοκυττάρων κατά τη διάγνωση, συνεχίζει να παρατηρείται χαμηλή πληρότητα σε παραμέτρους ιδιαίτερα σημαντικές για την επιδημιολογική επιτήρηση της HIV λοίμωξης, όπως είναι οι τιμές των CD4+ T-λεμφοκυττάρων κατά τη διάγνωση και ο πιθανός τρόπος μόλυνσης.

Επιδημιολογική Επιτήρηση HIV/AIDS στην Ελλάδα

Το επιδημιολογικό δελτίο για την πορεία του HIV/AIDS στην Ελλάδα εκδίδεται σε ετήσια βάση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Η παρούσα ετήσια έκδοση περιλαμβάνει περιστατικά HIV που διαγνώστηκαν έως τις 31/12/2025 και έχουν καταχωριστεί στο Εθνικό Μητρώο HIV έως τις 07/05/2026.

Προτεινόμενη αναφορά στη βιβλιογραφία:

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Δελτίο Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS στην Ελλάδα, 31-12-2025 (Τεύχος 40). Αθήνα 2026.
Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο: <https://eody.gov.gr>

HIV/AIDS Surveillance in Greece

The HIV/AIDS Surveillance Report in Greece is published annually by the National Public Health Organization (NPHO).

This annual edition includes HIV cases that have been diagnosed by 31/12/2025 and recorded in the National HIV Registry, by 07/05/2026.

Suggested Citation:

National Public Health Organization.
HIV/AIDS Surveillance Report in Greece,
31-12-2025 (Issue 40). Athens 2026.
Also available at: <https://eody.gov.gr>

Συνολική επιμέλεια: Τσιάρα Χρύσα
Διαχείριση δεδομένων-
Στατιστική ανάλυση: Λαλιώτη Νίκη
Φερεντίνος Γεώργιος
Συγγραφή προσχεδίου: Τσιάρα Χρύσα
Πίνακες και γραφήματα: Τσιάρα Χρύσα
Ερμηνεία δεδομένων: Ίσαρη Αικατερίνη
Μαγκαφάς Νικόλαος
Μαντάς Αθανάσιος
Νικολοπούλου Γεωργία
Παρασκευά Δήμητρα
Σμαράιδος Γεώργιος
Τσιάρα Χρύσα

Coordination: Tsiara Chrysa
Data management-
Statistical analysis: Lalioti Niki
Ferentinos Georgios
Draft document: Tsiara Chrysa
Tables and figures: Tsiara Chrysa
Data Interpretation: Isari Aikaterini
Mangafas Nikolaos
Mantas Athanasios
Nikolopoulou Georgia
Paraskeva Dimitra
Smaraidos Georgios
Tsiara Chrysa

ΕΟΔΥ

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

Υπουργείο Υγείας

Αγράφων 3 - 5

151 23 Μαρούσι

τηλ: 210 - 52.12.131-132-351

Ιστοσελίδα: <https://eody.gov.gr>

NPHO

National Public Health Organization

Ministry of Health

3 - 5, Agrafon str.

151 23 Marousi, Greece

Tel: (+30) 210 - 52.12.131-132-351

Website: <https://eody.gov.gr>

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε την ΗΔΙΚΑ για τη συνεργασία, όσον αφορά στη διαχείριση των δεδομένων του Εθνικού Μητρώου HIV.

Acknowledgements

We would like to thank IDIKA (e-Government Center for Social Security), for the co-operation regarding the management of the National HIV Registry Data.

Περιεχόμενα	◆	Contents
	Σελίδα Page	
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: HIV		FIRST SECTION: HIV
1. Νέες διαγνώσεις HIV	3	1. New HIV diagnoses
2. Περιστατικά HIV με προηγούμενη διάγνωση στο εξωτερικό	11	2. HIV cases diagnosed previously abroad
3. Σύνολο διαγνώσεων HIV	12	3. Cumulative number of HIV diagnoses
4. Κατηγορία μετάδοσης	18	4. Transmission mode
5. Διαγνώσεις HIV σε άτομα αλλοδαπής εθνικότητας	23	5. HIV diagnoses among foreign individuals
6. Διαγνώσεις HIV σε παιδιά ηλικίας <13 ετών	29	6. HIV diagnoses among children <13 years old
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: AIDS		SECOND SECTION: AIDS
1. Νέες διαγνώσεις AIDS	32	1. New AIDS diagnoses
2. Συνολικός αριθμός περιπτώσεων AIDS	35	2. Cumulative number of AIDS cases
3. Διαγνώσεις AIDS στον παιδικό πληθυσμό	37	3. AIDS diagnoses in children
4. Θάνατοι σε άτομα με AIDS	38	4. Deaths among AIDS cases
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ: Τεχνικές Παρατηρήσεις		THIRD SECTION: Technical Notes
Τεχνικές Παρατηρήσεις	43	Technical Notes
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	48	REFERENCES

HIV

Νέες διαγνώσεις HIV (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων AIDS)

Το 2025 διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 625 νέα περιστατικά HIV, εκ των οποίων 503 (80,5%) αφορούσαν σε άνδρες και 122 (19,5%) σε γυναίκες (Πίνακας 1). Από τις περιπτώσεις που διαγνώσθηκαν με HIV το 2025, 58 (9,3%) άτομα είχαν ήδη εμφανίσει (n=21) ή ανέπτυξαν κλινικά AIDS μέσα σε τρεις μήνες από τη διάγνωση (n=37). Το 38,4% των νέων διαγνώσεων είχε μολυνθεί μέσω σεξουαλικής επαφής μεταξύ ανδρών, το 14,6% μέσω ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής, το 12,8% μέσω της από κοινού χρήσης ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ για το 34,2% των περιπτώσεων δεν είχε προσδιοριστεί ο τρόπος μετάδοσης του HIV (Πίνακας 2). Το 2025, δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό κάθετης μετάδοσης, στην Ελλάδα (Πίνακας 2). Όσον αφορά στην εθνικότητα, το 60,2% των νέων διαγνώσεων αφορούσε σε άτομα ελληνικής εθνικότητας, το 38,9% σε άτομα προερχόμενα από χώρα του εξωτερικού, ενώ η συγκεκριμένη παράμετρος δεν είχε καταχωριστεί για το 0,9 % των νέων περιστατικών.

Τα περισσότερα περιστατικά HIV ήταν ηλικίας 30 – 39, 40 – 49 και 50+ ετών κατά τη διάγνωση (26,6%, 27,7% και 25,0%, αντίστοιχα) (Πίνακας 3). Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των νέων διαγνώσεων κατά κατηγορία μετάδοσης στις διάφορες ηλικιακές ομάδες. Στο σύνολο των νέων διαγνώσεων, τα περισσότερα περιστατικά με πιθανό τρόπο μετάδοσης τη σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 30-39 ετών, ενώ στα άτομα ηλικίας 50+ παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα καταγραφής ακαθόριστου τρόπου μετάδοσης.

Το 2025, οι τιμές των CD4+ T-λεμφοκυττάρων κατά τη διάγνωση της HIV λοίμωξης ήταν διαθέσιμες για 356 άτομα (57,0%). Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται 51 περιστατικά, τα οποία είχαν ήδη διαγνωστεί σε χώρα του εξωτερικού, τα οποία εξαιρούνται από την εκτίμηση του ποσοστού καθυστερημένης διάγνωσης. Μεταξύ των νέων διαγνώσεων, χωρίς ιστορικό προηγούμενης διάγνωσης στο εξωτερικό, με γνωστές τιμές CD4+ T-λεμφοκυττάρων κατά τη διάγνωση (n=305), 155 (50,8%) είχαν <350 κύτταρα/mm³ και 106 (34,8%) είχαν <200 κύτταρα/mm³. Όσον αφορά στα άτομα που είχαν μολυνθεί μέσω σεξουαλικής

New HIV diagnoses (including AIDS cases)

In 2025, 625 new HIV cases were diagnosed and reported. Of these, 503 (80.5%) were males and 122 (19.5%) were females (Table 1). Totally, 58 cases (9.3%), who were diagnosed with HIV in 2025, had already developed AIDS (n=21) or progressed to AIDS within three months after diagnosis (n=37). Sex between men was the most common mode of transmission among the new HIV diagnoses in 2025 (38.4%), followed by heterosexual contact (14.6%) and injecting drug use (12.8%) (Table 2). The route of HIV transmission remained undetermined in 34.2% of HIV diagnoses in 2025 (Table 2). During 2025, zero cases of vertical transmission were recorded (Table 2). 60.2% of new diagnoses related to individuals of greek nationality, 38.9 related to individuals from abroad, while nationality was undetermined in the 0.9% of new HIV cases.

Most HIV cases was 30 – 39, 40 – 49 and 50+ years old at the time of diagnosis (26.6%, 27.7% and 25.0%, respectively) (Table 3). Figure 1 depicts the distribution of new diagnoses by transmission category across various age groups.

The majority of HIV cases infected through sexual contact between men aged 30-39 years old, while in the age group of 50+, the frequency of unknown mode of transmission was increased.

Information on CD4+ T-cell count at the time of HIV diagnosis during 2025 was available for 356 cases (57.0%). For the estimation of the percentage of late diagnosis, 51 previous positive cases, already diagnosed abroad, were excluded. Among new HIV diagnosis, without a previous diagnosis abroad and available CD4+T-cell count (n=305), 155 (50.8%) had <350 cells/mm³ and 106 (34.8%) had <200 cells/mm³. In men who have sex with men (MSM) (available CD4+ T-cells for 135 HIV cases), the percentage of new HIV diagnoses with CD4+T-cell count <350 and <200 cells/mm³ came up to 37.8% (n=51) and 26.7% (n=36),

επαφής μεταξύ ανδρών (διαθέσιμα CD4+ T-λεμφοκύτταρα για 135 άτομα), το ποσοστό των νέων διαγνώσεων με CD4+ T-λεμφοκύτταρα <350 και <200 κύτταρα/mm³, ανήλθε σε 37,8% (n=51) και 26,7% (n=36), αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε άτομα που μολύνθηκαν μέσω ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής (διαθέσιμα CD4+ T-λεμφοκύτταρα για 47 άτομα) ήταν 70,2% (n=33) και 40,4% (n=19), και σε άτομα που μολύνθηκαν μέσω ενέσιμης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών (διαθέσιμα CD4+ T-λεμφοκύτταρα για 36 άτομα) ήταν 47,2% (n=17) και 33,3% (n=12), αντιστοίχως (Σχήμα 2).

Το 2023 και το 2024, το ποσοστό των νέων περιστατικών HIV με διαθέσιμη τιμή των CD4+ T-λεμφοκυττάρων κατά τη διάγνωση της HIV λοίμωξης ήταν αρκετά χαμηλότερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη (2019: 70,3%, 2020: 70,5%, 2021: 69,8%, 2022: 66,7%, 2023: 37,3%, 2024: 39,5%), γεγονός που κατέστησε δυσχερή την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με την καθυστερημένη διάγνωση, τόσο στο σύνολο των περιστατικών, όσο και σε συγκεκριμένες υπο-ομάδες. Ωστόσο, το 2025 καταγράφηκε βελτίωση στο ποσοστό πληρότητας των CD4+ T-λεμφοκυττάρων κατά τη διάγνωση, το οποίο ανήλθε σε 57%. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, το 2025, τα υψηλότερα ποσοστά καθυστερημένης διάγνωσης (CD4<350 κύτταρα/mm³), καταγράφηκαν στα άτομα που μολύνθηκαν μέσω ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής (70,2%), στα περιστατικά ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών κατά τη διάγνωση (72,2%), στις γυναίκες (63,2%) και στα άτομα αλλοδαπής εθνικότητας (58,3%) (Σχήμα 2).

Το 65,0% των περιστατικών HIV που διαγνώστηκαν το 2025, ξεκίνησε αντιρετροϊκή θεραπεία εντός 30 ημερών από τη στιγμή της διάγνωσης, ενώ το 81,8% άρχισε να λαμβάνει αγωγή μέσα σε 90 ημέρες από τη διάγνωση (Σχήμα 3). Από την ανάλυση των δεδομένων που αφορούσαν στην έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής ανά κατηγορία μετάδοσης, προέκυψε ότι μεταξύ των διαγνώσεων HIV του 2025, τα υψηλότερα ποσοστά έναρξης αντιρετροϊκής αγωγής εντός τριμήνου από τη διάγνωση, παρατηρήθηκαν στα άτομα που μολύνθηκαν μέσω σεξουαλικής επαφής μεταξύ ανδρών (92,5%) και στα ετεροφυλόφιλα άτομα (91,2%) (Σχήμα 4 και Σχήμα 5), ενώ στους χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών καταγράφηκε το χαμηλότερο ποσοστό (60,0%) (Σχήμα 4, Σχήμα 6, Σχήμα 7). Επίσης, το ποσοστό των ατόμων ελληνικής εθνικότητας που διαγνώστηκαν το

respectively. The corresponding percentages for persons who acquired HIV heterosexually (available CD4+ T- cells for 47 HIV cases) were 70.2% (n=33) and 40.4% (n=19) and for people who injected drugs (PWID) (available CD4+ cells for 36 HIV cases) were 47.2% (n=17) and 33.3% (n=12), respectively (Figure 2).

During 2023 and 2024, the percentage of newly diagnosed HIV cases with available CD4+ T-cell counts was decreased compared to previous years (2019: 70.3%, 2020: 70.5%, 2021: 69.8%, 2022: 66.7%, 2023: 37.3%, 2024: 39.5%). This incompleteness of data, made it difficult to draw safe conclusions on late HIV diagnosis, among the total number of new HIV cases and certain sub-populations. In 2025, the completeness of this parameter improved (CD4+T-cell count was available for 57% of new HIV diagnoses). According to the available data, in 2025, the highest proportion of late HIV diagnosis (CD4<350 cells/mm³) was recorded among people infected through heterosexual contact (70.2%), cases older than 50 years old at the time of HIV diagnosis (72.2%), women (63.2%) and foreigners (58.3%) (Figure 2).

65.0% of HIV cases diagnosed during 2025, initiated antiretroviral treatment within 30 days after HIV diagnosis, whereas 81.8% started receiving antiretrovirals (ARVs) within 90 days from HIV diagnosis (Figure 3). When analyzing data regarding linkage to treatment after HIV diagnosis by mode of HIV transmission, the highest percentage of antiretroviral drugs initiation within 3 months after diagnosis, was observed among MSM (92.5%) and heterosexuals (91.2%) (Figure 4 and Figure 5), whereas the lowest percentage was recorded in PWIDs (60.0%) (Figure 4, Figure 6, Figure 7). Additionally, the proportion of Greeks diagnosed during 2025 and started receiving antiretrovirals within 90 days from HIV diagnosis, was higher compared to that of foreign HIV cases (86.2% and

2025 και ξεκίνησαν αντιρετροϊκή θεραπεία μέσα σε 90 ημέρες από τη διάγνωση, ήταν υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των αλλοδαπών (86,2% και 75,3%, αντίστοιχα) (Σχήμα 8, Σχήμα 9).

75.3%, respectively) (Figure 8, Figure 9).

Πίνακας 1

Table 1

Νέες διαγνώσεις HIV λοίμωξης κατά φύλο στην Ελλάδα (1/1/2025 - 31/12/2025)					
New HIV diagnoses by sex in Greece (1/1/2025 - 31/12/2025)					
Φύλο**	HIV	AIDS*	Σύνολο - Total		Sex**
	N	N	N	%	
Άνδρες	485	18	503	(80,5)	Males
Γυναίκες	119	3	122	(19,5)	Females
Σύνολο	604	21	625	100,0	Total

* Περιστατικά που διαγνώστηκαν το 2025 και είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

** Περιλαμβάνονται 6 διεμφυλικά άτομα

* Cases presenting with AIDS when first diagnosed with HIV in 2025

** Including 6 transgender people

Πίνακας 2

Table 2

Νέες διαγνώσεις HIV λοίμωξης* κατά κατηγορία μετάδοσης και κατά φύλο στην Ελλάδα (1/1/2025 - 31/12/2025)							
New HIV diagnoses* by transmission mode and sex in Greece (1/1/2025 - 31/12/2025)							
Κατηγορία μετάδοσης	Άνδρες		Γυναίκες		Σύνολο		Transmission mode
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	
Σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών	240	(47,7)	0	(0,0)	240	(38,4)	Sex between men
Ετεροφυλοφιλική σεξουαλική επαφή	38	(7,6)	53	(43,4)	91	(14,6)	Heterosexual contact
Ενέσιμη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών	68	(13,5)	12	(9,8)	80	(12,8)	Injecting drug use
Κάθετη μετάδοση	0	(0,0)	0	(0,0)	0	(0,0)	Mother to child transmission
Ακαθόριστη	157	(31,2)	57	(46,7)	214	(34,2)	Undetermined
Σύνολο	503	100	122	100	625	100	Total

* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when first diagnosed with HIV

Πίνακας 3

Table 3

Νέες διαγνώσεις HIV λοίμωξης* κατά ηλικιακή ομάδα κατά τη διάγνωση και κατά φύλο στην Ελλάδα (1/1/2025 - 31/12/2025)						
New HIV diagnoses* by age group at the time of diagnosis and gender, Greece (1/1/2025 - 31/12/2025)						
Ηλικιακή ομάδα Age group	Άνδρες Males		Γυναίκες Females		Σύνολο Total	
	N	(%)	N	(%)	N	(%)
< 15 ετών - years old	0	(0,0)	0	(0,0)	0	(0,0)
15 – 19 ετών - years old	4	(0,8)	1	(0,8)	5	(0,8)
20 – 24 ετών - years old	25	(5,0)	17	(13,9)	42	(6,7)
25 – 29 ετών - years old	61	(12,1)	22	(18,0)	83	(13,3)
30 – 39 ετών - years old	137	(27,2)	29	(23,8)	166	(26,6)
40 – 49 ετών - years old	143	(28,4)	30	(24,6)	173	(27,7)
50+ ετών - years old	133	(26,4)	23	(18,9)	156	(25,0)
Σύνολο - Total	503	100,0	122	100,0	625	100,0

* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS


* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

Σχήμα 1

Figure 1

Νέες διαγνώσεις HIV λοίμωξης* κατά ηλικιακή ομάδα κατά τη διάγνωση και κατηγορία μετάδοσης στην Ελλάδα (1/1/2025 - 31/12/2025)

New HIV diagnoses reported* by age group at the time of diagnosis and transmission mode, Greece (1/1/2025 - 31/12/2025)




* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

Σχήμα 2

Figure 2

Ποσοστό περιστατικών HIV* που διαγνώστηκαν καθυστερημένα το 2025** (CD4<350 κύτταρα/mm³), ανά φύλο, κατηγορία μετάδοσης, ηλικιακή ομάδα και εθνικότητα (1/1/2025 - 31/12/2025)
Proportion of HIV cases* diagnosed late in 2025** (CD4<350 cells/mm³), by sex, transmission group, age group and ethnicity (1/1/2025 - 31/12/2025)



* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when first diagnosed with HIV

**Εξαιρούνται τα περιστατικά με προηγούμενη διάγνωση στο εξωτερικό. Δεν λαμβάνονται υπ' όψιν οι τιμές των CD4+ T-λεμφοκυττάρων των περιστατικών με πρωτολοίμωξη.

**Previous positive cases diagnosed abroad are excluded. CD4+ T-cell counts of cases with primary HIV infection are not taken into account

Σχήμα 3

Figure 3

Ποσοστό περιστατικών HIV* που ξεκίνησαν αντιρετροϊκή αγωγή μέσα σε 30 και 90 ημέρες από τη διάγνωση, ανά έτος διάγνωσης (2014 – 2025)
Proportion of HIV cases* initiated antiretroviral treatment within 30 and 90 days after HIV diagnosis, by year of diagnosis (2014 – 2025)




* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when first diagnosed with HIV

Σχήμα 4

Figure 4

Ποσοστό περιστατικών HIV* που διαγνώστηκαν το 2025 και ξεκίνησαν αντιρετροϊκή αγωγή μέσα σε 30 και 90 ημέρες από τη διάγνωση ανά κατηγορία μετάδοσης
Proportion of HIV cases* diagnosed in 2025 and initiated antiretroviral treatment within 30 and 90 days after HIV diagnosis, by mode of transmission




* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when first diagnosed with HIV

Σχήμα 5

Figure 5

Ποσοστό περιστατικών HIV* που μολύνθηκαν μέσω σεξουαλικής επαφής μεταξύ ανδρών και ξεκίνησαν αντιρετροϊκή αγωγή μέσα σε 30 και 90 ημέρες από τη διάγνωση, ανά έτος διάγνωσης (2014 – 2025)
Proportion of HIV cases* infected through sexual contact between men and initiated antiretroviral treatment within 30 and 90 days after HIV diagnosis, by year of diagnosis (2014 – 2025)




* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when first diagnosed with HIV

Σχήμα 6

Figure 6

Ποσοστό περιστατικών HIV* που μολύνθηκαν μέσω ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής και ξεκίνησαν αντιρετροϊκή αγωγή μέσα σε 30 και 90 ημέρες από τη διάγνωση, ανά έτος διάγνωσης (2014 – 2025)
Proportion of HIV cases* infected through heterosexual contact and initiated antiretroviral treatment within 30 and 90 days after HIV diagnosis, by year of diagnosis (2014 – 2025)




* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when first diagnosed with HIV

Σχήμα 7

Figure 7

Ποσοστό περιστατικών HIV* που μολύνθηκαν μέσω χρήσης ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών και ξεκίνησαν αντιρετροϊκή αγωγή μέσα σε 30 και 90 ημέρες από τη διάγνωση, ανά έτος διάγνωσης (2014 – 2025)
Proportion of HIV cases* infected through injecting drug use and initiated antiretroviral treatment within 30 and 90 days after HIV diagnosis, by year of diagnosis (2014 – 2025)




* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when first diagnosed with HIV

Σχήμα 8

Figure 8

Ποσοστό περιστατικών HIV* ελληνικής εθνικότητας που ξεκίνησαν αντιρετροϊκή αγωγή μέσα σε 30 και 90 ημέρες από τη διάγνωση, ανά έτος διάγνωσης (2014 – 2025)
Proportion of HIV cases* of greek nationality who initiated antiretroviral treatment within 30 and 90 days after HIV diagnosis, by year of diagnosis (2014 – 2025)



* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when first diagnosed with HIV

Σχήμα 9

Figure 9

Ποσοστό περιστατικών HIV* αλλοδαπής εθνικότητας που ξεκίνησαν αντιρετροϊκή αγωγή μέσα σε 30 και 90 ημέρες από τη διάγνωση, ανά έτος διάγνωσης (2014 – 2025)
Proportion of HIV cases* of foreign nationality who initiated antiretroviral treatment within 30 and 90 days after HIV diagnosis, by year of diagnosis (2014 – 2025)



* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when first diagnosed with HIV

Περιστατικά HIV με προηγούμενη διάγνωση στο εξωτερικό

Μεταξύ των 625 περιστατικών HIV που διαγνώστηκαν στην Ελλάδα το 2025, περιλαμβάνονται 85 (13,6%) με προηγούμενη διάγνωση σε χώρα του εξωτερικού (άνδρες: n=70, 82,3% και γυναίκες: n=15, 17,7%). Η πλειοψηφία είχε ελληνική εθνικότητα (n=25, 29,41%), ενώ τα περισσότερα περιστατικά αλλοδαπής εθνικότητας προέρχονταν από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (n=14, 23,3%) και της Υποσαχάριας Αφρικής (n=13, 21,7%). Όσον αφορά στον τρόπο μετάδοσης, το 61,2% μολύνθηκε μέσω σεξουαλικής επαφής μεταξύ ανδρών, το 17,6% μέσω ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής και το 4,7% μέσω της από κοινού χρήσης ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ για το 16,5% των περιστατικών δεν είχε καταγραφεί ο πιθανός τρόπος μόλυνσης. Τα περισσότερα άτομα ήταν ηλικίας 30-39 (32,9%) και 40-49 ετών (31,8%) κατά τη διάγνωση στην Ελλάδα.

Συγκρίνοντας τα περιστατικά HIV με προηγούμενη διάγνωση στο εξωτερικό με αυτά που διαγνώστηκαν πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2025, παρατηρείται υψηλότερο ποσοστό μετάδοσης μέσω σεξουαλικής επαφής μεταξύ ανδρών (61,2% έναντι 34,8%), και αρκετά χαμηλότερο μέσω χρήσης ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών (4,7% έναντι 14,1%). Επίσης, τα ήδη διεγνωσμένα με HIV άτομα έχουν αλλοδαπή εθνικότητα σε μεγαλύτερο ποσοστό (70,6% έναντι 29,4%) σε σχέση με τις νέες διαγνώσεις HIV (Σχήμα 10).

HIV cases diagnosed previously abroad


Among 625 HIV cases diagnosed during 2025 in Greece, 85 HIV positive individuals diagnosed previously abroad were included (men: n=70; 82.3% and women: n=15; 17.7%). The majority were of greek nationality (n=25; 29.41%), whereas most of the previous positive foreign individuals came from Eastern Europe (n=14; 23.3%) and Sub-Saharan Africa (n=13; 21.7%). Main route of HIV transmission was sexual contact between men (61.2%), followed by heterosexual contact (17.6%) and injecting drug use (4.7%). Mode of HIV acquisition was undetermined for 16.5% of cases. The predominant age groups at diagnosis in Greece were 30-39 (32.9%) and 40-49 years old (31.8%)

When comparing cases with previous HIV diagnosis to those diagnosed for the first time in Greece during 2025, a higher proportion had been infected through sexual contact between men (61.2% versus 34.8%) and a lower percentage through intravenous drug use (4.7% versus 14.1%). In addition, a larger percentage of foreigners is observed among previously diagnosed cases compared to cases newly diagnosed with HIV in Greece (70.4% versus 29.4%) (Figure 10)

Σχήμα 10

Figure 10

Κατανομή νέων διαγνώσεων HIV* και περιστατικών HIV με προηγούμενη διάγνωση στο εξωτερικό* ανά φύλο, ομάδα ηλικιών, εθνικότητα και κατηγορία μετάδοσης (2025)
New HIV diagnoses* and HIV cases previously diagnosed abroad* by sex, age group, nationality and transmission mode (2025)



* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when first diagnosed with HIV

Σύνολο διαγνώσεων HIV (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων AIDS)

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών HIV (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων AIDS) που έχουν διαγνωστεί στην Ελλάδα έως τις 31/12/2025 ανέρχεται σε 21.918, εκ των οποίων τα 17.961 (81,9%) ήταν άνδρες, τα 3.916 (17,9%) ήταν γυναίκες, ενώ για 41 άτομα (0,2%) το φύλο δεν δηλώθηκε. Στον Πίνακα 4 και στο Σχήμα 11 παρουσιάζεται διαχρονικά η κατανομή των διαγνώσεων HIV/AIDS με βάση το έτος διάγνωσης στα δύο φύλα.

Μέχρι και το 2010, οι ετήσιες διαγνώσεις HIV στην Ελλάδα, δεν ξεπερνούσαν τις 6 ανά 100.000 πληθυσμού (Πίνακας 4, Σχήμα 12). Ωστόσο, το 2011 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση (8,7 διαγνώσεις /100.000 πληθυσμού), η οποία κορυφώθηκε το 2012 (10,5 διαγνώσεις/100.000 πληθυσμού), ενώ από το 2013, οι νέες διαγνώσεις HIV εμφανίζουν πτωτική τάση (Πίνακας 4, Σχήμα 12). Το 2024 ο αριθμός των νέων διαγνώσεων ανήλθε σε 6,2 ανά 100.000 πληθυσμού, ενώ το 2025 μειώθηκε σε 6,0 ανά 100.000 πληθυσμού (Πίνακας 4, Σχήμα 12). Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα τελευταία έτη (μετά το 2017) παρατηρείται σταδιακή αύξηση των δηλωθέντων περιστατικών HIV με προηγούμενη διάγνωση στο εξωτερικό, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την εικόνα που διαμορφώνεται για την κατάσταση της επιδημίας στη χώρα αναφορικά με τις νέες διαγνώσεις (Σχήμα 13). Σύμφωνα με το σχήμα 13, εάν ληφθούν υπόψη μόνο οι νέες διαγνώσεις HIV, εξαιρώντας τα περιστατικά που είχαν ήδη διαγνωστεί στο εξωτερικό πριν καταγραφούν στην Ελλάδα, ο ετήσιος αριθμός των νέων διαγνώσεων HIV ανά 100.000 πληθυσμού διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα. Η εξαίρεση των περιστατικών με προηγούμενη διάγνωση στο εξωτερικό φαίνεται να επηρεάζει τον ετήσιο αριθμό των διαγνώσεων ανά 100.000 πληθυσμού από το 2018 και έπειτα, ενώ πριν το συγκεκριμένο έτος δεν παρατηρείται κάποια σημαντική μεταβολή. Ειδικότερα, εάν στην ανάλυση των ετήσιων διαγνώσεων ανά 100.000 πληθυσμού περιληφθούν μόνο οι νέες διαγνώσεις HIV, το αντίστοιχο ποσοστό για το 2024 ανέρχεται σε 5,5/100.000 πληθυσμού και για το 2025 σε 5,2/100.000 πληθυσμού (Σχήμα 13).

Ο αυξημένος αριθμός των νέων περιστατικών HIV που παρατηρήθηκε από το 2011, συμπίπτει χρονικά με την επιδημική έκρηξη του HIV που παρατηρήθηκε στους

Cumulative number of HIV diagnoses (including AIDS cases)

The cumulative number of HIV cases (including AIDS cases) diagnosed in Greece by 31/12/2025 was 21,918. Of these, 17,961 (81.9%) were males and 3,916 (17.9%) were females. Sex was not reported for 41 (0.2%) HIV cases. Table 4 and Figure 11 depicts the distribution of HIV/AIDS diagnoses over time in Greece by sex.

Until 2010, annual HIV diagnoses in Greece, were below 6 per 100,000 population (Table 4, Figure 12). However, in 2011 and 2012, a rise in HIV diagnoses was observed (8.7 HIV cases/100,000 population and 10.5 HIV cases/100,000 population, respectively). (Table 4, Figure 12). A decline of the annual rate of HIV diagnosis has been observed since 2013 (Table 4, Figure 12). In 2024 newly diagnosed HIV cases came up to 6.2 per 100,000 population, while during 2025 decreased to 6.0 per 100,000 population (Table 4, Figure 12).

It is noteworthy that after 2017, a gradual increase in recorded HIV cases diagnosed previously abroad is observed, which could affect the picture of the HIV epidemic in the country (Figure 13). According to figure 13, when only new HIV diagnoses are considered, excluding previous positive cases diagnosed abroad, the annual HIV rate per 100,000 population is shifting to lower levels. The exclusion of previous positive cases seems to impact the annual HIV diagnoses rate per 100,000 population from 2018 and thereafter, whereas before this year, no significant variation is noted. More specifically, if only new HIV diagnoses are included in the annual rate per 100,000 population analysis, the annual rates for 2024 and 2025 come up to 5.5/100,000 and 5.2/100,000 population, respectively (Figure 13).

The increased number of newly diagnosed HIV cases recorded from 2011, coincides in time with the HIV epidemic observed in PWIDs. In 2011, the number of

χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών. Το 2011 τα νέα περιστατικά HIV που μολύνθηκαν μέσω της από κοινού χρήσης ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών ανήλθαν σε 318 (περίπου 1000% αύξηση συγκριτικά με το 2010), ενώ το 2012 διαγνώστηκαν 524 περιστατικά (Σχήμα 14). Από το 2013 παρατηρείται ελάττωση των νέων διαγνώσεων HIV που αφορούν σε χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών, χωρίς ωστόσο να έχουν προσεγγιστεί τα προ της επιδημίας επίπεδα (Σχήμα 14).

Από την ανάλυση των νέων διαγνώσεων των τελευταίων 15 ετών κατά ηλικιακή ομάδα, φαίνεται ότι έως και το 2024 επικρατούσα ηλικιακή ομάδα κατά τη διάγνωση ήταν αυτή των 30-39 ετών και ακολουθούσε η ομάδα των 40-49 ετών. Το 2025, η εικόνα άλλαξε. Η μεγαλύτερη σε συχνότητα ηλικιακή ομάδα ήταν των 40-49 ετών και ακολουθούσε η ομάδα των 30-39 ετών. Επίσης, τα τελευταία έτη παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των νέων διαγνώσεων ηλικίας ≥ 50 ετών (Σχήμα 15).

newly diagnosed PWIDs came up to 318 (approximately 1.000% increase, compared to 2010), whereas in 2012, 524 HIV cases among PWIDs were newly diagnosed (Figure 14). Since 2013, the annual number of HIV diagnoses in PWIDs is decreasing. However, it hasn't reached the pre-epidemic levels (Figure 14).

According to the analysis of newly diagnosed HIV cases during the last 15 years by age group, until 2024, the predominant age group at the time of diagnosis was that of 30-39 years old, followed by the age group of 40-49 years old. In 2025, the situation changed. The most frequent age group was 40-49 years old, followed by the 30-39 age group. Additionally, during the last years, a stable increase in newly diagnosed HIV cases aged ≥ 50 years old is observed (Figure 15).

Πίνακας 4

Figure 4

Διαγνώσεις HIV* κατά έτος διάγνωσης και κατά φύλο στην Ελλάδα (μέχρι 31/12/2025) HIV* diagnoses by year of diagnosis and sex in Greece (by 31/12/2025)						
Έτος διάγνωσης - Year of diagnosis	Άνδρες - Males		Γυναίκες - Females		Σύνολο** Total**	Συχνότητα*** Rate***
	N	%	N	%	N	
1981	1	(100,0)	0	(0,0)	1	0,0
1982	2	(100,0)	0	(0,0)	2	0,0
1983	14	(100,0)	0	(0,0)	14	0,1
1984	70	(98,6)	1	(1,4)	71	0,7
1985	106	(90,6)	11	(9,4)	117	1,2
1986	105	(88,2)	14	(11,8)	119	1,2
1987	148	(86,0)	24	(14,0)	172	1,7
1988	169	(86,7)	22	(11,3)	195	1,9
1989	202	(83,8)	36	(14,9)	241	2,4
1990	251	(84,8)	44	(14,9)	296	2,9
1991	285	(83,3)	57	(16,7)	342	3,3
1992	358	(84,8)	64	(15,2)	422	4,1
1993	286	(79,7)	73	(20,3)	359	3,4
1994	285	(82,6)	60	(17,4)	345	3,3
1995	363	(82,3)	78	(17,7)	441	4,1
1996	380	(80,7)	91	(19,3)	471	4,4
1997	358	(78,9)	93	(20,5)	454	4,2
1998	447	(77,9)	107	(18,6)	574	5,3
1999	367	(75,8)	115	(23,8)	484	4,4
2000	352	(75,7)	112	(24,1)	465	4,3
2001	299	(73,1)	108	(26,4)	409	3,7
2002	307	(76,4)	95	(23,6)	402	3,7
2003	332	(76,7)	99	(22,9)	433	3,9
2004	393	(79,1)	101	(20,3)	497	4,5
2005	413	(75,8)	132	(24,2)	545	5,0
2006	410	(79,5)	106	(20,5)	516	4,7
2007	476	(84,1)	90	(15,9)	566	5,1
2008	521	(83,0)	107	(17,0)	628	5,7
2009	525	(84,0)	100	(16,0)	625	5,6
2010	574	(87,8)	80	(12,2)	654	5,9
2011	828	(85,4)	142	(14,6)	970	8,7
2012	986	(84,7)	178	(15,3)	1164	10,5
2013	808	(89,9)	91	(10,1)	899	8,2
2014	686	(87,1)	102	(12,9)	788	7,2
2015	692	(88,0)	94	(12,0)	786	7,2
2016	542	(82,5)	115	(17,5)	657	6,1
2017	539	(82,9)	111	(17,1)	650	6,0
2018	586	(80,5)	142	(19,5)	728	6,8
2019	526	(77,8)	150	(22,2)	676	6,3
2020	502	(80,4)	122	(19,6)	624	5,8
2021	467	(80,8)	111	(19,2)	578	5,4
2022	466	(79,7)	119	(20,3)	585	5,6
2023	524	(77,1)	156	(22,9)	680	6,5
2024	507	(78,2)	141	(21,8)	648	6,2
2025	503	(80,5)	122	(19,5)	625	6,0
Σύνολο - Total	17.961	(81,9)	3.916	(17,9)	21.918	

* Περιλαμβάνονται περιστατικά που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

**Περιλαμβάνονται 62 διεμφυλικά άτομα και 41 άτομα με άγνωστο φύλο

*** Ανά 100.000 πληθυσμού

* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV


** Including 62 transgender cases and 41 caes of unknown sex

*** Per 100,000 population

Σχήμα 11

Figure 11

Ετήσιες διαγνώσεις HIV λοίμωξης* κατά φύλο στην Ελλάδα (2007-2025)
Annual HIV diagnoses* by sex in Greece (2007-2025)




* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

Σχήμα 12

Figure 12

Ετήσιες διαγνώσεις HIV λοίμωξης* ανά 100.000 πληθυσμού στην Ελλάδα (2007-2025)
Annual HIV diagnoses* per 100,000 population in Greece (2007-2025)




* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

Σχήμα 13

Figure 13

Ετήσιες διαγνώσεις HIV λοίμωξης* (σύνολο/νέες διαγνώσεις/προηγούμενες διαγνώσεις στο εξωτερικό) ανά 100.000 πληθυσμού στην Ελλάδα (2010-2025)
Annual HIV diagnoses* (total/new diagnoses/previous positives abroad) per 100,000 population in Greece (2010-2025)




* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

Σχήμα 14

Figure 14

Ετήσιες διαγνώσεις HIV* κατά κατηγορία μετάδοσης και έτος διάγνωσης στην Ελλάδα (2010-2025)
Annual HIV diagnoses* by transmission mode and year of diagnosis in Greece (2010-2025)




* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

Σχήμα 15

Figure 15

Ποσοστιαία κατανομή των ετήσιων διαγνώσεων HIV λοίμωξης* κατά ηλικιακή ομάδα κατά τη διάγνωση στην Ελλάδα (2011 – 2025)



* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

Κατηγορία μετάδοσης

Συνολικά, η απροφύλακτη σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών αποτελεί μέχρι σήμερα τον κυριότερο τρόπο μετάδοσης του HIV στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το 47,1% των περιστατικών HIV που έχουν διαγνωστεί έως και τις 31/12/2025, αφορά σε άνδρες που ανέφεραν ότι μολύνθηκαν μέσω απροφύλακτης σεξουαλικής επαφής με άνδρες (Πίνακας 5), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό, εάν εξαιρεθούν τα περιστατικά με απροσδιόριστο τρόπο μετάδοσης, ανέρχεται σε 57,0% (Σχήμα 16).

Στο σύνολο των 4.713 ατόμων που έχουν μολυνθεί μέσω ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής, η πλειοψηφία αφορά σε γυναίκες (n=2.567, 54,5%) (Πίνακας 6), οι οποίες κατά τα τελευταία έτη υπερτερούν έναντι των αντρών στο σύνολο των νέων διαγνώσεων που αφορούν στη συγκεκριμένη κατηγορία μετάδοσης (Σχήμα 17). Στο σύνολο των περιστατικών HIV ελληνικής εθνικότητας υπερτερεί η σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών, ως πιθανός τρόπος μετάδοσης, ενώ στα HIV θετικά περιστατικά αλλοδαπής εθνικότητας συχνότερη κατηγορία μετάδοσης είναι η ετεροφυλοφιλική σεξουαλική επαφή (Σχήμα 18).

Έως και το 2010, ο ετήσιος αριθμός των νέων περιστατικών HIV, για τα οποία ως πιθανός τρόπος μόλυνσης είχε δηλωθεί η από κοινού χρήση ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών, δεν ξεπερνούσε τις 30. Το 2011 και το 2012 καταγράφηκε μία μεγάλη αύξηση των νέων περιστατικών HIV που μολύνθηκαν μέσω της από κοινού χρήσης ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών, η οποία αφορούσε στην περιοχή της Αττικής (n=318 και n=524, αντίστοιχα). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012, για πρώτη φορά ο αριθμός αλλά και η ποσοστιαία αναλογία των νέων διαγνώσεων που αφορούσαν σε χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών, ξεπέρασαν τις αντίστοιχες τιμές που είχαν καταγραφεί σε περιστατικά HIV θετικών ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες (Σχήμα 14 και Σχήμα 19). Από το 2013, οι διαγνώσεις HIV στη συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζουν σταδιακή ελάττωση, χωρίς ωστόσο να έχουν προσεγγιστεί τα προ της επιδημίας (2011-2012) επίπεδα (Σχήμα 14).

Transmission mode

Unprotected male-to-male sexual contact is the most frequently reported mode of HIV transmission in Greece. In total, 47.1% of HIV cases, diagnosed in Greece by 31/12/2025, were between men reporting having sex with men (MSM) (Table 5). After excluding cases with undocumented mode of HIV transmission, the aforementioned percentage comes up to 57.0% (Figure 16).

Of 4,713 cases infected through unprotected heterosexual contact, the majority (n=2,567; 54.5%) are females (Table 6). During last years, female is the predominant sex among annual HIV cases which acquired HIV heterosexually (Figure 17). Among greek HIV cases, the predominant mode of HIV transmission is sexual contact between men, while the majority of foreigners acquired HIV heterosexually (Figure 18).

Until 2010, the annual number of newly diagnosed HIV cases among PWIDs was below 30. In 2011 and 2012, a vast increase of new HIV cases infected through injecting drug use in Attica region was observed (n=318 and n=524, respectively). It is noteworthy that, in 2012, the frequency of new HIV cases among PWIDs (both the absolute number and the percentage) exceeded that of MSM HIV cases (Figure 14 and Figure 19). HIV diagnoses attributed to injecting drug use have been decreasing since 2013, without reaching the pre-epidemic (2011 – 2012) levels (Figure 14).

Πίνακας 5

Table 5

HIV διαγνώσεις* κατά κατηγορία μετάδοσης και κατά φύλο στην Ελλάδα (μέχρι 31/12/2025)
HIV diagnoses* by transmission mode and sex in Greece (by 31/12/2025)

Κατηγορία μετάδοσης	Άνδρες Males		Γυναίκες Females		Σύνολο ** Total **		Transmission mode
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	
Σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών	10.320	(57,5)	-		10.320	(47,1)	Sex between men
Ετεροφυλοφιλική σεξουαλική επαφή	2.142	(11,9)	2.567	(65,6)	4.713	(21,5)	Heterosexual contact
Ενέσιμη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών	2.206	(12,3)	446	(11,4)	2.652	(12,1)	Injecting drug use
Πολυμεταγγιζόμενοι/ες με παράγωγα αίματος	220	(1,2)	17	(0,4)	237	(1,1)	Multitransfusion of blood and blood products
Μετάγγιση	60	(0,3)	43	(1,1)	103	(0,5)	Transfusion
Κάθετη μετάδοση	45	(0,3)	46	(1,2)	92	(0,4)	Mother to child
Ακαθόριστο	2.968	(16,5)	797	(20,4)	3.801	(17,3)	Undetermined
Σύνολο	17.961	(100,0)	3.916	(100,0)	21.918	(100,0)	Total

* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

** Περιλαμβάνονται 62 διεμφυλικά άτομα και 41 άτομα με άγνωστο φύλο


** Including 62 transgender people and 41 cases of unknown sex

Σχήμα 16

Figure 16

HIV διαγνώσεις* κατά κατηγορία μετάδοσης στην Ελλάδα μέχρι 31/12/2025
(δεν περιλαμβάνονται περιστατικά στα οποία δεν έχει προσδιοριστεί ο τρόπος μετάδοσης)

HIV diagnoses* by transmission group in Greece reported by 31/12/2025
(cases with undocumented transmission mode were excluded)



* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

Πίνακας 6

Table 6

HIV διαγνώσεις *σε άτομα που έχουν μολυνθεί μέσω ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής κατά έτος διάγνωσης και φύλο στην Ελλάδα (μέχρι 31/12/2025)					
HIV diagnoses* (Heterosexually-acquired infections) by year of diagnosis and sex in Greece (by 31/12/2025)					
Έτος διάγνωσης Year of diagnosis	Άνδρες - Males		Γυναίκες - Females		Σύνολο ** Total **
	N	%	N	%	N
1983	1	(100,0)	0	(0,0)	1
1984	4	(100,0)	0	(0,0)	4
1985	1	(14,3)	6	(85,7)	7
1986	7	(46,7)	8	(53,3)	15
1987	8	(36,4)	14	(63,6)	22
1988	10	(38,5)	16	(61,5)	26
1989	17	(50,0)	17	(50,0)	34
1990	28	(48,3)	30	(51,7)	58
1991	19	(31,1)	42	(68,9)	61
1992	38	(42,7)	51	(57,3)	89
1993	27	(34,6)	51	(65,4)	78
1994	28	(37,3)	47	(62,7)	75
1995	28	(33,3)	56	(66,7)	84
1996	42	(37,8)	69	(62,2)	111
1997	44	(40,0)	66	(60,0)	110
1998	44	(35,2)	77	(61,6)	125
1999	64	(45,7)	76	(54,3)	140
2000	57	(39,9)	86	(60,1)	143
2001	39	(33,9)	76	(66,1)	115
2002	53	(43,8)	68	(56,2)	121
2003	64	(48,9)	67	(51,1)	131
2004	78	(51,0)	75	(49,0)	153
2005	75	(42,9)	100	(57,1)	175
2006	74	(46,8)	84	(53,2)	158
2007	70	(50,0)	70	(50,0)	140
2008	92	(52,9)	82	(47,1)	174
2009	68	(49,3)	70	(50,7)	138
2010	64	(51,6)	60	(48,4)	124
2011	93	(59,6)	63	(40,4)	156
2012	90	(56,3)	70	(43,8)	160
2013	75	(57,7)	55	(42,3)	130
2014	83	(57,2)	62	(42,8)	145
2015	70	(53,8)	60	(46,2)	130
2016	64	(43,2)	84	(56,8)	148
2017	75	(48,1)	81	(51,9)	156
2018	83	(46,4)	96	(53,6)	179
2019	83	(42,6)	112	(57,4)	195
2020	59	(44,0)	75	(56,0)	134
2021	51	(40,2)	76	(59,8)	127
2022	53	(40,8)	77	(59,2)	130
2023	41	(36,3)	72	(63,7)	113
2024	40	(37,4)	67	(62,6)	107
2025	38	(41,8)	53	(58,2)	91
Σύνολο - Total	2.142	(45,4)	2.567	(54,5)	4.713

*Περιλαμβάνονται περιστατικά που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη AIDS **Περιλαμβάνονται 4 περιστατικά ακαθορίστου φύλου


* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

** Including 4 cases of unknown sex

Σχήμα 17

Figure 17

Ετήσιες διαγνώσεις HIV λοίμωξης* κατά φύλο σε άτομα που μολύνθηκαν μέσω ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής (2007-2025)
Annual HIV diagnoses* by sex among people infected through heterosexual contact (2007-2025)




* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

Σχήμα 18

Figure 18

Συνολικές διαγνώσεις HIV λοίμωξης* ανά εθνικότητα και κατηγορία μετάδοσης (σεξ, επαφή και ενέσιμη χρήση ουσιών) έως και 31/12/2025
Total number of HIV diagnoses* by nationality and mode of transmission (sexual contact and injecting drug use) by 31/12/2025



* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS


* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

Σχήμα 19

Figure 19

Ποσοστιαία αναλογία ετήσιων διαγνώσεων HIV* που μολύνθηκαν μέσω σεξουαλικής επαφής ή από κοινού χρήσης ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών, κατά κατηγορία μετάδοσης και έτος διάγνωσης στην Ελλάδα (2010-2025)

Percentage of annual HIV cases* infected through sexual contact or injecting drug use by transmission mode and year of diagnosis in Greece (2010-2025)



* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

Διαγνώσεις HIV σε άτομα αλλοδαπής εθνικότητας

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων αλλοδαπής εθνικότητας που έχουν διαγνωστεί με HIV (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων AIDS) μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανέρχεται σε 5.373. Από τα περιστατικά αυτά, 3.558 (66,2%) αφορούν σε άνδρες, 1.808 (33,7%) σε γυναίκες και 7 (0,1%) σε άτομα όπου δεν έχει δηλωθεί το φύλο (Πίνακας 7 και Πίνακας 8). Από το σύνολο των διαγνώσεων HIV έως το τέλος του 2025, τα 1.113 (20,7%) άτομα είχαν εμφανίσει AIDS (Πίνακας 8). Τα περισσότερα περιστατικά, τόσο στους άνδρες (37,2%), όσο και στις γυναίκες (33,7%), ήταν ηλικίας 30-39 ετών κατά τη διάγνωση (Πίνακας 9).

Η πλειοψηφία των περιστατικών HIV αλλοδαπής εθνικότητας μολύνθηκε μέσω ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής (37,6%), ενώ ακολουθεί η σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών (25,0%) και η χρήση ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών (15,2%). Αντίθετα, στο σύνολο των διαγνώσεων ελληνικής εθνικότητας υπερτερεί η σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών (56,6%) (Πίνακας 10).

Στον Πίνακα 11 απεικονίζεται η κατανομή των HIV διαγνώσεων ανά εθνικότητα και φύλο. Η πλειοψηφία των γυναικών αλλοδαπής εθνικότητας προέρχονται από χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής (50,9%), ενώ των ανδρών από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (25,3%).

Έως και το 2002, ο ετήσιος αριθμός των καταγεγραμμένων διαγνώσεων σε άτομα αλλοδαπής εθνικότητας δεν ξεπερνούσε τις 100. Ωστόσο, κατά τα τελευταία έτη παρατηρείται αυξητική τάση (Πίνακας 7). Ειδικότερα, η ποσοστιαία αναλογία των ατόμων αλλοδαπής εθνικότητας στο σύνολο των ετήσιων διαγνώσεων με γνωστή εθνικότητα, κατά την τελευταία τετραετία, κυμαίνεται από 39% (το 2022) έως 40% (το 2024), ενώ κατά το 2025 ανήλθε σε 39% (Σχήμα 20).

Το 2025 διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 243 νέα περιστατικά HIV αλλοδαπής εθνικότητας, εκ των οποίων 169 (69,5%) αφορούσαν σε άνδρες και 74 (30,5%) σε γυναίκες (Πίνακας 7). Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται 60 περιστατικά, τα οποία είχαν ήδη διαγνωστεί σε χώρα του εξωτερικού, τα οποία εξαιρούνται από την εκτίμηση του ποσοστού καθυστερημένης διάγνωσης. Μεταξύ των νέων διαγνώσεων σε άτομα αλλοδαπής εθνικότητας, χωρίς

HIV diagnoses among foreign individuals

The cumulative number of HIV diagnoses among foreign people (including AIDS cases) who had been diagnosed in Greece by 31st of December 2025 is 5,373. Of these, 3,558 (66.2%) are males, 1,808 (33.7%) are females and 7 (0.1%) are of unknown sex (Table 7 and Table 8). Totally, 1,113 cases (20.7%), who were diagnosed with HIV by the end of 2025, had developed AIDS (Table 8). The predominant age group in both males (37.2%) and females (33.7%) was that of 30-39 years old (Table 9).

The majority of foreign HIV individuals were infected through heterosexual contact (37.6%), followed by sexual contact between men (25.0%) and injecting drug use (15.2%). In the contrary, among HIV diagnoses of greek nationality, the most frequent mode of HIV transmission is sexual contact between men (56.6%) (Table 10).

Table 11 shows the distribution of HIV diagnoses by nationality and sex. Females of foreign nationality are originated mainly from Sub-Saharan countries (50.9%) and males from Central Europe countries (25.3%).

Until 2002, the annual documented HIV diagnoses among foreign individuals in Greece were less than 100. However, an increase has been observed, during the last years (Table 7). During the last five years, the percentage of foreigners among all cases of known nationality, ranged between 39% (in 2022) and 40% (in 2024), whereas in 2025 came up to 39% (Figure 20).

In 2025, 243 new HIV cases among foreign individuals were diagnosed and reported. Of these, 169 (69.5%) were males and 74 (30.5%) were females (Table 7). For the estimation of the percentage of late diagnosis, 60 HIV cases with a previous diagnosis abroad were excluded. Information on CD4+ T-cell count at the time of HIV diagnosis was available for 96 cases without a previous HIV diagnosis abroad, of whom, 56 (58.3%) had <350 cells/mm³ (Figure 2).

ιστορικό προηγούμενης διάγνωσης στο εξωτερικό, με γνωστές τιμές CD4 κατά τη διάγνωση (n=96), 56 (58,3%) είχαν <350 κύτταρα/mm³ (Σχήμα 2).

Το 59,7% των περιστατικών HIV αλλοδαπής εθνικότητας που διαγνώστηκαν το 2025, ξεκίνησε αντιρετροϊκή θεραπεία εντός 30 ημερών από τη στιγμή της διάγνωσης, ενώ το 75,3% άρχισε να λαμβάνει αγωγή μέσα σε 90 ημέρες από τη διάγνωση (Σχήμα 9).

59.7% of foreigners diagnosed with HIV during 2025, initiated antiretroviral treatment within 30 days after HIV diagnosis, whereas 75.3% started receiving antiretrovirals (ARVs) within 90 days from HIV diagnosis (Figure 9).

Πίνακας 7

Table 7

Διαγνώσεις HIV* κατά έτος διάγνωσης και φύλο σε άτομα αλλοδαπής εθνικότητας στην Ελλάδα (μέχρι 31/12/2025)					
HIV diagnoses* by year of diagnosis and sex in foreign people in Greece (by 31/12/2025)					
Έτος διάγνωσης Year of diagnosis	Άνδρες - Males		Γυναίκες - Females		Σύνολο** Total**
	N	%	N	%	N
1983	1	(100,0)	0	(0,0)	1
1984	4	(100,0)	0	(0,0)	4
1985	10	(90,9)	1	(9,1)	11
1986	13	(76,5)	4	(23,5)	17
1987	12	(100,0)	0	(0,0)	12
1988	12	(80,0)	3	(20,0)	15
1989	19	(73,1)	7	(26,9)	26
1990	21	(75,0)	7	(25,0)	28
1991	25	(86,2)	4	(13,8)	29
1992	27	(69,2)	12	(30,8)	39
1993	26	(68,4)	12	(31,6)	38
1994	21	(67,7)	10	(32,3)	31
1995	29	(65,9)	15	(34,1)	44
1996	28	(62,2)	17	(37,8)	45
1997	40	(60,6)	26	(39,4)	66
1998	51	(52,6)	40	(41,2)	97
1999	47	(50,5)	45	(48,4)	93
2000	49	(57,6)	36	(42,4)	85
2001	49	(53,3)	43	(46,7)	92
2002	46	(50,5)	45	(49,5)	91
2003	72	(61,0)	46	(39,0)	118
2004	73	(56,6)	56	(43,4)	129
2005	84	(57,9)	61	(42,1)	145
2006	81	(58,3)	58	(41,7)	139
2007	77	(61,6)	48	(38,4)	125
2008	94	(62,7)	56	(37,3)	150
2009	96	(59,6)	65	(40,4)	161
2010	90	(63,4)	52	(36,6)	142
2011	168	(77,8)	48	(22,2)	216
2012	230	(74,7)	78	(25,3)	308
2013	201	(80,1)	50	(19,9)	251
2014	151	(79,5)	39	(20,5)	190
2015	123	(72,4)	47	(27,6)	170
2016	116	(66,7)	58	(33,3)	174
2017	146	(70,5)	61	(29,5)	207
2018	171	(63,3)	99	(36,7)	270
2019	177	(62,5)	106	(37,5)	283
2020	164	(65,6)	86	(34,4)	250
2021	128	(68,8)	58	(31,2)	186
2022	150	(65,8)	78	(34,2)	228
2023	106	(60,2)	70	(39,8)	176
2024	161	(64,9)	87	(35,1)	248
2025	169	(69,5)	74	(30,5)	243
Σύνολο – Total**	3.558	(66,2)	1.808	(33,7)	5.373

* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS


* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

** Περιλαμβάνονται 35 διεμφυλικά άτομα και 7 άτομα με άγνωστο φύλο

** Including 35 transgender people and 7 cases of unknown sex

Σχήμα 20

Figure 20



* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

Πίνακας 8

Table 8

Διαγνώσεις HIV λοίμωξης και AIDS κατά φύλο σε άτομα αλλοδαπής εθνικότητας στην Ελλάδα έως 31/12/2025					
HIV and AIDS diagnoses by sex in foreign people in Greece by 31/12/2025					

Φύλο	HIV N	AIDS N	Σύνολο – Total*		Sex
Ανδρες	2.793	765	3.558	(66,2)	Males
Γυναίκες	1.460	348	1.808	(33,7)	Females
Άγνωστο	7	0	7	(0,1)	Unknown
Σύνολο*	4.260	1.113	5.373	100,0	Total*

*Περιλαμβάνονται 35 διεμφυλικά άτομα και 7 άτομα με άγνωστο φύλο

* Including 35 transgender people and 7 cases of unknown sex

Πίνακας 9

Table 9

Διαγνώσεις HIV λοίμωξης* κατά ηλικιακή ομάδα κατά τη διάγνωση και φύλο σε άτομα αλλοδαπής εθνικότητας στην Ελλάδα έως 31/12/2025

HIV diagnoses* by age group at the time of diagnosis and sex in foreign people in Greece by 31/12/2025

Ηλικιακή ομάδα Age group	Άνδρες Males		Γυναίκες Females		Σύνολο** Total**	
	N	(%)	N	(%)	N	(%)
< 15 ετών - years old	18	(0,5)	24	(1,3)	42	(0,8)
15 – 19 ετών - years old	40	(1,1)	39	(2,2)	79	(1,5)
20 – 24 ετών - years old	295	(8,3)	234	(12,9)	531	(9,9)
25 – 29 ετών - years old	615	(17,3)	386	(21,3)	1001	(18,6)
30 – 39 ετών - years old	1325	(37,2)	610	(33,7)	1936	(36,0)
40 – 49 ετών - years old	789	(22,2)	288	(15,9)	1077	(20,0)
50+ ετών - years old	432	(12,1)	189	(10,5)	622	(11,6)
Άγνωστη - Unknown	44	(1,2)	38	(2,1)	85	(1,6)
Σύνολο - Total	3.558	(100,0)	1.808	(100,0)	5.373	(100,0)

* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

**Περιλαμβάνονται 35 διεμφυλικά άτομα και 7 άτομα με άγνωστο φύλο

** Including 35 transgender people and 7 cases of unknown sex

Πίνακας 10

Table 10

HIV διαγνώσεις* κατά κατηγορία μετάδοσης και εθνικότητα στην Ελλάδα (μέχρι 31/12/2025)

HIV diagnoses* by transmission mode and nationality in Greece (by 31/12/2025)

Κατηγορία μετάδοσης	Ελληνική Greek		Μη Ελληνική Non-Greek		Άγνωστη Unknown		Σύνολο Total		Transmission mode
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	
Σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών	8.731	(56,6)	1341	(25,0)	248	(22,3)	10.320	(47,1)	Sex between men
Ετεροφυλοφιλική σεξουαλική επαφή	2.590	(16,8)	2.021	(37,6)	102	(9,2)	4.713	(21,5)	Heterosexual contact
Ενέσιμη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών	1.748	(11,3)	817	(15,2)	87	(7,8)	2.652	(12,1)	Injecting drug use
Πολυμεταγγιζόμενοι/ες με παράγωγα αίματος	231	(1,5)	5	(0,1)	1	(0,1)	237	(1,1)	Multitransfusion of blood and blood products
Μετάγγιση	79	(0,5)	22	(0,4)	2	(0,2)	103	(0,5)	Transfusion
Κάθετη μετάδοση	54	(0,3)	37	(0,7)	1	(0,1)	92	(0,4)	Mother to child
Ακαθόριστο	2.000	(13,0)	1130	(21,0)	671	(60,3)	3.801	(17,3)	Undetermined
Σύνολο	15.433	(100,0)	5.373	(100,0)	1.112	(100,0)	21.918	(100,0)	Total

*Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

Πίνακας 11

Table 11

Διαγνώσεις HIV λοίμωξης* κατά φύλο και εθνικότητα σε άτομα αλλοδαπής εθνικότητας στην Ελλάδα έως 31/12/2025							
HIV diagnoses* by sex and nationality in foreign people in Greece by 31/12/2025							
Εθνικότητα	Άνδρες Males		Γυναίκες Females		Σύνολο** Total**		Nationality
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	
Δυτική Ευρώπη	410	(11,5)	74	(4,1)	484	(9,0)	West Europe
Κεντρική Ευρώπη	901	(25,3)	295	(16,3)	1197	(22,3)	Central Europe
Ανατολική Ευρώπη	599	(16,8)	361	(20,0)	960	(17,9)	East Europe
Υποσαχάρια Αφρική	666	(18,7)	920	(50,9)	1592	(29,6)	Sub Saharan Africa
Ανατολική Ασία - Ειρηνικός	12	(0,3)	3	(0,2)	15	(0,3)	East Asia - Pacific
Αυστραλία	23	(0,6)	6	(0,3)	29	(0,5)	Australia
Νότια - Ανατολική Ασία	401	(11,3)	54	(3,0)	455	(8,5)	South - East Asia
Βόρεια Αφρική - Μέση Ανατολή	297	(8,3)	26	(1,4)	323	(6,0)	North Africa - Middle East
Βόρεια Αμερική	81	(2,3)	10	(0,6)	91	(1,7)	North America
Καραϊβική	34	(1,0)	8	(0,4)	42	(0,8)	Caribbean
Λατινική Αμερική	80	(2,2)	24	(1,3)	104	(1,9)	Latin America
Αλλοδαποί άγνωστης εθνικότητας	54	(1,5)	27	(1,5)	81	(1,5)	Foreigners of unknown nationality
Σύνολο**	3.558	(100,0)	1.808	(100,0)	5.373	(100,0)	Total

* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS

* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

** Περιλαμβάνονται 35 διεμφυλικά άτομα και 7 άτομα με άγνωστο φύλο

** Including 35 transgender people and 7 cases of unknown sex

Διαγνώσεις HIV σε παιδιά ηλικίας < 13 ετών

Το 2025 δεν διαγνώστηκε στην Ελλάδα κανένα παιδί ηλικίας μικρότερης των 13 ετών.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών HIV, ηλικίας μικρότερης των 13 ετών κατά τη διάγνωση, (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων AIDS) που έχουν διαγνωστεί στην Ελλάδα έως και τις 31/12/2025 ανέρχεται σε 148, εκ των οποίων τα 95 (64,2%) ήταν αγόρια, τα 52 (35,1%) ήταν κορίτσια, ενώ για 1 παιδί (0,7%) το φύλο δεν δηλώθηκε (Πίνακας 12). Το 56,8% των παιδιών που διαγνώστηκαν με HIV σε ηλικία μικρότερη των 13 ετών, έχει μολυνθεί κάθετα, κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού ή του θηλασμού (Πίνακας 13), ενώ εάν εξαιρεθούν τα περιστατικά με ακαθόριστο τρόπο μετάδοσης, το συγκεκριμένο ποσοστό ανέρχεται σε 60,0% (Σχήμα 21).

HIV diagnoses among children < 13 years old

In 2025, no child under the age of 13 years old was diagnosed in Greece.

Totally, 148 HIV cases in children, aged < 13 years old at the time of diagnosis, have been diagnosed in Greece by 31/12/2024. Of these, 95 (64.2%) were males and 52 (35.1%) were females (Table 12). Sex was not reported for 1 (0.7%) child. 56.8% of children diagnosed with HIV (aged < 13 years old at the time of diagnosis), have been infected vertically, during pregnancy, labor and delivery, or breastfeeding (Table 13). After excluding cases with undetermined route of transmission, this percentage comes up to 60.0% (Figure 21).

Πίνακας 12

Table 12

Διαγνώσεις HIV θετικών παιδιών* στην Ελλάδα μέχρι 31/12/2025, κατά ηλικιακή ομάδα κατά τη διάγνωση και φύλο

HIV diagnoses among children* in Greece until 31/12/2025, by age group at the time of diagnosis and sex

Ηλικιακή ομάδα Age group	Αγόρια Males		Κορίτσια Females		Σύνολο Total	
	N	(%)	N	(%)	N	(%)
0 – 11 μηνών – months**	17	(17,9)	21	(40,4)	39	(26,4)
1 – 4 ετών - years old	31	(32,6)	14	(26,9)	45	(30,4)
5 – 9 ετών - years old	25	(26,3)	10	(19,2)	35	(23,6)
10 – 12 ετών - years old	22	(23,2)	7	(13,5)	29	(19,6)
Σύνολο – Total**	95	(100,0)	52	(100,0)	148	(100,0)

* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS * Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

** Περιλαμβάνεται 1 περιστατικό ακαθόριστου φύλου ** Including 1 case of unknown sex

Πίνακας 13

Table 13

Διαγνώσεις HIV θετικών παιδιών* στην Ελλάδα μέχρι 31/12/2025, κατά κατηγορία μετάδοσης και φύλο

HIV diagnoses among children* in Greece until 31/12/2025, by transmission group and sex

Κατηγορία μετάδοσης	Αγόρια Males		Κορίτσια Females		Σύνολο Total		Transmission mode
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	
Πολυμεταγγιζόμενοι/ες με παράγωγα αίματος	43	(45,3)	4	(7,7)	47	(31,8)	Multitransfusion of blood and blood products
Μετάγγιση	5	(5,3)	4	(7,7)	9	(6,1)	Transfusion
Κάθετη μετάδοση**	40	(42,1)	43	(82,7)	84	(56,8)	Mother to child**
Ακαθόριστο	7	(7,4)	1	(1,9)	8	(5,4)	Undetermined
Σύνολο**	95	(100,0)	52	(100,0)	148	(100,0)	Total**


* Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS * Including cases presenting with AIDS when diagnosed

** Περιλαμβάνεται 1 περιστατικό ακαθόριστου φύλου ** Including 1 case of unknown sex

Σχήμα 21

Figure 21

Διαγνώσεις HIV θετικών παιδιών* κατά κατηγορία μετάδοσης στην Ελλάδα μέχρι 31/12/2025
(δεν περιλαμβάνονται άτομα στα οποία δεν έχει προσδιοριστεί ο τρόπος μετάδοσης)
HIV diagnoses* among children in Greece by 31/12/2025 by transmission group
(cases with undocumented transmission mode were excluded)



*Συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών που όταν διαγνώστηκαν είχαν ήδη αναπτύξει AIDS
* Including cases presenting with AIDS when diagnosed with HIV

AIDS

Νέες διαγνώσεις AIDS

Το 2025 διαγνώσθηκαν και δηλώθηκαν 62 περιστατικά AIDS, εκ των οποίων 52 (83,9%) ήταν άνδρες και 10 (16,1%) γυναίκες (Πίνακας 14, Σχήμα 22). Από τις περιπτώσεις αυτές, οι 58 (93,5%) είχαν ήδη εκδηλώσει AIDS όταν διαγνώστηκαν με HIV ή εκδήλωσαν AIDS εντός 3 μηνών από τη διάγνωση της HIV λοίμωξης. Το 35,5% των νέων περιπτώσεων AIDS ήταν άνδρες που είχαν απροφύλακτες σεξουαλικές επαφές με άνδρες, το 19,4% είχε μολυνθεί μέσω απροφύλακτης ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής, ενώ στο 8,1% των περιπτώσεων AIDS, η μετάδοση είχε γίνει μέσω της ενέσιμης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Για το 37,1% των περιστατικών AIDS, η κατηγορία μετάδοσης δεν είχε προσδιοριστεί (Πίνακας 15). Η πλειονότητα των νέων περιπτώσεων AIDS (38,7%) αφορά σε ηλικίες μεγαλύτερες των 50 ετών κατά τη διάγνωση (Πίνακας 16).

Το 2025, τα 3 συχνότερα εμφανιζόμενα ενδεικτικά νοσήματα κατά τη διάγνωση του AIDS ήταν η πνευμονία από *Pneumocystis jirovecii* (29,0%), το σύνδρομο απίσχνασης οφειλόμενο σε HIV (11,3%) και το σάρκωμα Kaposi (9,7%).

New AIDS diagnoses

In 2025, 62 AIDS cases were diagnosed in Greece. Of these, 52 (83.9%) were males and 10 (16.1%) were females (Table 14, Figure 22). 58 cases (93.5%) had already developed AIDS at the time of diagnosis or progressed to AIDS within 3 months after their HIV diagnosis. 35.5% of newly diagnosed AIDS cases had been infected through sexual contact between men, 19.4% through heterosexual contact, whereas injecting drug use accounted for 8.1% of AIDS cases. The route of transmission was not determined in 37.1% of AIDS cases (Table 15). The majority of AIDS cases (38.7%) were older than 50 years old at the time of their diagnosis (Table 16).

In 2025, the 3 most commonly reported indicative diseases of AIDS were *Pneumocystis jirovecii* pneumonia (29.0%), HIV associated wasting syndrome (11.3%) and Kaposi's sarcoma (9.7%).

Πίνακας 14**Table 14**


Διαγνώσεις AIDS κατά φύλο στην Ελλάδα (1/1/2025 - 31/12/2025)			
AIDS diagnoses by sex in Greece (1/1/2025 - 31/12/2025)			
Άνδρες	52	(83,9)	Males
Γυναίκες	10	(16,1)	Females
Σύνολο	62	(100,0)	Total

Σχήμα 22

Figure 22

Διαγνώσεις AIDS ανά φύλο στην Ελλάδα (2007-2025)

AIDS diagnoses by sex in Greece (2007-2025)



Πίνακας 15

Table 15

Διαγνώσεις AIDS κατά κατηγορία μετάδοσης και κατά φύλο στην Ελλάδα (1/1/2025 - 31/12/2025)

AIDS diagnoses by transmission group and sex in Greece (1/1/2025 - 31/12/2025)

Κατηγορία μετάδοσης	Άνδρες Males		Γυναίκες Females		Σύνολο Total		Transmission mode
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	
Σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών	22	(42,3)	-	-	22	(35,5)	Sex between men
Ετεροφυλοφιλική σεξουαλική επαφή	5	(9,6)	7	(70,0)	12	(19,4)	Heterosexual contact
Ενέσιμη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών	5	(9,6)	0	(0,0)	5	(8,1)	Injecting drug use
Πολυμεταγγιζόμενοι/ες με παράγωγα αίματος	0	(0,0)	0	(0,0)	0	(0,0)	Multitransfusion of blood and blood products
Μετάγγιση	0	(0,0)	0	(0,0)	0	(0,0)	Transfusion
Κάθετη μετάδοση	0	(0,0)	0	(0,0)	0	(0,0)	Mother to child
Ακαθόριστο	20	(38,5)	3	(30,0)	23	(37,1)	Undetermined
Σύνολο	52	(100,0)	10	(100,0)	62	(100,0)	Total

Πίνακας 16

Table 16

Διαγνώσεις AIDS, κατά ηλικιακή ομάδα κατά τη διάγνωση και κατά φύλο στην Ελλάδα (1/1/2025 - 31/12/2025)

AIDS diagnoses by age group at diagnosis and sex in Greece (1/1/2025 - 31/12/2025)

Ηλικιακή ομάδα Age group	Άνδρες Males		Γυναίκες Females		Σύνολο Total	
	N	(%)	N	(%)	N	(%)
< 15 ετών - years old	0	(0,0)	0	(0,0)	0	(0,0)
15 – 19 ετών - years old	0	(0,0)	0	(0,0)	0	(0,0)
20 – 24 ετών - years old	0	(0,0)	0	(0,0)	0	(0,0)
25 – 29 ετών - years old	2	(3,8)	2	(20,0)	4	(6,5)
30 – 39 ετών - years old	16	(30,8)	2	(20,0)	18	(29,0)
40 – 49 ετών - years old	14	(26,9)	2	(20,0)	16	(25,8)
50+ ετών - years old	20	(38,5)	4	(40,0)	24	(38,7)
Σύνολο - Total	52	(100,0)	10	(100,0)	62	(100,0)

Συνολικός αριθμός περιπτώσεων AIDS

Ο συνολικός αριθμός των περιπτώσεων AIDS που διαγνώστηκαν στην Ελλάδα μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου του 2025, ανέρχεται σε 5.095, εκ των οποίων 4.238 (83,2%) ήταν άνδρες και 857 (16,8%) γυναίκες (Πίνακας 17).

Στο σύνολο των περιστατικών AIDS με καταγεγραμμένο τρόπο μετάδοσης που έχουν διαγνωστεί έως τις 31/12/2025, η πλειοψηφία έχει μολυνθεί μέσω σεξουαλικής επαφής μεταξύ ανδρών (n=2.562, 55,4%) και ακολουθεί η ετεροφυλοφυλική σεξουαλική επαφή (n=1.374, 29,7%) και η ενέσιμη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (n=465, 10,1%) (Σχήμα 23).

Cumulative number of AIDS cases


In total, 5,095 AIDS cases have been diagnosed in Greece by December 31st, 2025. Of these, 4,238 (83.2%) were males and 857 (16.8%) were females (Table 17).

Among AIDS cases with documented mode of transmission, diagnosed by 31/12/2025, the predominant route of HIV acquisition is sexual contact between men (n=2,562; 55.4%), followed by heterosexual contact (n=1,374; 29.7%) and injecting drug use (n=465; 10.1%) (Figure 23).

Σχήμα 23

Figure 23

Διαγνώσεις AIDS κατά κατηγορία μετάδοσης στην Ελλάδα έως 31/12/2025
(δεν περιλαμβάνονται περιστατικά με αδιευκρίνιστο τρόπο μετάδοσης)
AIDS diagnoses by transmission group in Greece by 31/12/2025
(cases with undocumented transmission mode were excluded)



Πίνακας 17

Table 17

Διαγνώσεις AIDS, κατά έτος διάγνωσης και κατά φύλο στην Ελλάδα, μέχρι 31/12/2025 AIDS diagnoses by year of diagnosis and sex in Greece by 31/12/2025						
Έτος διάγνωσης Year of diagnosis	Άνδρες – Males		Γυναίκες - Females		Σύνολο - Total	Συχνότητα (ανά 100.000) - Rate (per 100,000)
	N	(%)	N	(%)	N	
1981	1	(100,0)	0	(0,0)	1	0,01
1982	2	(100,0)	0	(0,0)	2	0,02
1983	5	(100,0)	0	(0,0)	5	0,05
1984	5	(100,0)	0	(0,0)	5	0,05
1985	16	(100,0)	0	(0,0)	16	0,16
1986	25	(100,0)	0	(0,0)	25	0,25
1987	59	(92,2)	5	(7,8)	64	0,64
1988	66	(91,7)	6	(8,3)	72	0,72
1989	94	(87,0)	14	(13,0)	108	1,07
1990	126	(88,1)	17	(11,9)	143	1,41
1991	163	(88,1)	22	(11,9)	185	1,80
1992	168	(87,5)	24	(12,5)	192	1,85
1993	150	(87,2)	22	(12,8)	172	1,64
1994	186	(85,3)	32	(14,7)	218	2,07
1995	191	(86,4)	30	(13,6)	221	2,08
1996	195	(81,9)	43	(18,1)	238	2,22
1997	152	(85,9)	25	(14,1)	177	1,64
1998	114	(85,7)	19	(14,3)	133	1,23
1999	114	(80,3)	28	(19,7)	142	1,30
2000	119	(86,2)	19	(13,8)	138	1,26
2001	72	(72,7)	27	(27,3)	99	0,90
2002	83	(81,4)	19	(18,6)	102	0,93
2003	85	(81,7)	19	(18,3)	104	0,95
2004	81	(83,5)	16	(16,5)	97	0,89
2005	95	(79,2)	25	(20,8)	120	1,09
2006	71	(72,4)	27	(27,6)	98	0,89
2007	85	(78,0)	24	(22,0)	109	0,99
2008	108	(86,4)	17	(13,6)	125	1,13
2009	98	(79,7)	25	(20,3)	123	1,11
2010	102	(82,3)	22	(17,7)	124	1,12
2011	92	(82,1)	20	(17,9)	112	1,01
2012	110	(83,3)	22	(16,7)	132	1,19
2013	125	(84,5)	23	(15,5)	148	1,35
2014	121	(84,0)	23	(16,0)	144	1,32
2015	119	(81,5)	27	(18,5)	146	1,34
2016	118	(75,6)	38	(24,4)	156	1,45
2017	111	(79,3)	29	(20,7)	140	1,30
2018	104	(87,4)	15	(12,6)	119	1,11
2019	89	(74,8)	30	(25,2)	119	1,11
2020	97	(82,9)	20	(17,1)	117	1,09
2021	71	(73,2)	26	(26,8)	97	0,91
2022	64	(76,2)	20	(23,8)	84	0,81
2023	84	(85,7)	14	(14,3)	98	0,93
2024	50	(79,4)	13	(20,6)	63	0,61
2025	52	(83,9)	10	(16,1)	62	0,60
Σύνολο – Total*	4.238	83,2	857	16,8	5.095	

*Περιλαμβάνονται 9 διεμφυλικά άτομα * Including 9 transgender people **Ανά 100.000 πληθυσμού ** Per 100,000 population

Διαγνώσεις AIDS στον παιδικό πληθυσμό

Ο συνολικός αριθμός των περιπτώσεων AIDS σε παιδιά (< 13 ετών κατά τη διάγνωση) παραμένει χαμηλός στην Ελλάδα (Πίνακας 18). Σε σύνολο 38 παιδιατρικών περιστατικών AIDS, το 65,8% είχε μολυνθεί κάθετα κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού ή του θηλασμού (Πίνακας 19). Το 2025 δεν διαγνώστηκαν παιδιά με AIDS.

AIDS diagnoses in children

The total number of paediatric AIDS cases (younger than 13 years old at AIDS diagnosis) remains low in Greece (Table 18). Among 38 paediatric AIDS cases, 65.8% had been infected vertically (Table 19). In 2025 no paediatric AIDS case was diagnosed.

Πίνακας 18

Table 18

Διαγνώσεις HIV και AIDS κατά φύλο στην Ελλάδα, σε παιδιά ηλικίας < 13 ετών έως 31/12/2025
HIV and AIDS diagnoses by sex in Greece, among children < 13 years old by 31/12/2025

Φύλο	HIV N	(%)	AIDS N	(%)	Σύνολο - Total	Sex
Άρρεν	71	(64,5)	24	(63,2)	95	Males
Θήλυ	38	(34,5)	14	(36,8)	52	Females
Άγνωστο	1	(0,9)	0	(0,0)	1	Unknown
Σύνολο	110	(100,0)	38	(100,0)	148	Total

Πίνακας 19

Table 19

Διαγνώσεις AIDS σε παιδιά, κατά κατηγορία μετάδοσης και φύλο στην Ελλάδα, μέχρι 31/12/2025
Paediatric cases of AIDS diagnosis in Greece (by 31/12/2025) by transmission group and sex

Κατηγορία μετάδοσης	Αγόρια Males		Κορίτσια Females		Σύνολο Total		Transmission group
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	
Πολυμεταγγιζόμενοι/ες με παράγωγα αίματος	11	(45,8)	0	(0,0)	11	(28,9)	Multitransfusion of blood and blood products
Μετάγγιση	0	(0,0)	2	(14,3)	2	(5,3)	Transfusion
Κάθετη μετάδοση	13	(54,2)	12	(85,7)	25	(65,8)	Mother to child
Σύνολο	24	(100,0)	14	(100,0)	38	(100,0)	Total

Θάνατοι σε άτομα με AIDS

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων σε ασθενείς με AIDS έως και την 31^η Δεκεμβρίου του 2025 ανήλθε σε 2.496, ενώ το 2025 απεβίωσαν 44 άτομα με AIDS. Η πλειοψηφία των ασθενών με AIDS που έχουν αποβιώσει είναι άνδρες (n=2.154, 86,3%), γεγονός που αντανακλά την υψηλότερη εκατοστιαία αναλογία των ανδρών επί του συνόλου των ατόμων που έχουν διαγνωσθεί με AIDS (Πίνακας 20).

Η σημαντική μείωση στον αριθμό των διαγνώσεων AIDS και στον αριθμό των θανάτων, η οποία παρατηρήθηκε μετά το 1996, οφείλεται στην εισαγωγή της αντιρετροϊκής θεραπείας υψηλής δραστηριότητας (Highly Active Antiretroviral Therapy – HAART), η οποία καθυστερεί την κλινική εξέλιξη της νόσου και βελτιώνει το προσδόκιμο επιβίωσης (Σχήματα 24-26).

Deaths among AIDS cases

The total number of deaths among AIDS cases by December 31st, 2025, came up to 2.496, while 44 individuals with AIDS died in 2025. Most of the deaths among AIDS cases have been observed in males (n=2,154; 86.3%), reflecting the higher percentage of men diagnosed with AIDS (Table 20).

The significant decline in AIDS cases and deaths observed after 1996 is attributed to Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART), which delays clinical progression and improves the survival of HIV infected individuals (Figures 24-26).

Πίνακας 20

Table 20

Θάνατοι σε άτομα με AIDS, κατά έτος θανάτου και κατά φύλο στην Ελλάδα, μέχρι 31/12/2025
Deaths among AIDS cases by year of death and sex in Greece by 31/12/2025


Έτος θανάτου Year of death	Άνδρες* Males*		Γυναίκες Females		Σύνολο Total
	N	%	N	%	N
1983	1	(100,0)	0	(0,0)	1
1984	5	(100,0)	0	(0,0)	5
1985	6	(100,0)	0	(0,0)	6
1986	10	(100,0)	0	(0,0)	10
1987	27	(90,0)	3	(10,0)	30
1988	32	(97,0)	1	(3,0)	33
1989	44	(91,7)	4	(8,3)	48
1990	48	(92,3)	4	(7,7)	52
1991	45	(86,5)	7	(13,5)	52
1992	72	(92,3)	6	(7,7)	78
1993	73	(90,1)	8	(9,9)	81
1994	85	(89,5)	10	(10,5)	95
1995	102	(88,7)	13	(11,3)	115
1996	154	(86,0)	25	(14,0)	179
1997	206	(88,0)	28	(12,0)	234
1998	70	(85,4)	12	(14,6)	82
1999	64	(86,5)	10	(13,5)	74
2000	52	(80,0)	13	(20,0)	65
2001	48	(82,8)	10	(17,2)	58
2002	30	(81,1)	7	(18,9)	37
2003	52	(86,7)	8	(13,3)	60
2004	32	(86,5)	5	(13,5)	37
2005	59	(89,4)	7	(10,6)	66
2006	34	(89,5)	4	(10,5)	38
2007	39	(75,0)	13	(25,0)	52
2008	32	(88,9)	4	(11,1)	36
2009	35	(85,4)	6	(14,6)	41
2010	50	(83,3)	10	(16,7)	60
2011	54	(87,1)	8	(12,9)	62
2012	59	(84,3)	11	(15,7)	70
2013	41	(89,1)	5	(10,9)	46
2014	49	(89,1)	6	(10,9)	55
2015	40	(78,4)	11	(21,6)	51
2016	36	(70,6)	15	(29,4)	51
2017	43	(79,6)	11	(20,4)	54
2018	44	(86,3)	7	(13,7)	51
2019	41	(83,7)	8	(16,3)	49
2020	41	(82,0)	9	(18,0)	50
2021	46	(88,5)	6	(11,5)	52
2022	35	(81,4)	8	(18,6)	43
2023	44	(86,3)	7	(13,7)	51
2024	37	(88,1)	5	(11,9)	42
2025	37	(84,1)	7	(15,9)	44
Σύνολο - Total	2.154	(86,3)	342	(13,7)	2.496

Σχήμα 24

Figure 24

Ετήσιες διαγνώσεις AIDS ανά 100.000 πληθυσμού στην Ελλάδα (2007-2025)

Annual AIDS diagnoses per 100,000 population in Greece (2007-2025)




Σχήμα 25

Figure 25

Θάνατοι σε άτομα με AIDS, κατά έτος θανάτου και κατά φύλο στην Ελλάδα, μέχρι 31/12/2025


Deaths among AIDS cases by year of death and sex in Greece by 31/12/2025



Σχήμα 26

Figure 26

Ετήσιες διαγνώσεις HIV, κρούσματα AIDS και θάνατοι σε άτομα με AIDS στην Ελλάδα, μέχρι 31/12/2025
Annual HIV diagnoses, AIDS cases and deaths among AIDS cases in Greece by 31/12/2025



Τεχνικές Παρατηρήσεις

Technical Notes

Τεχνικές Παρατηρήσεις

Επιδημιολογική επιτήρηση

Η επιδημιολογική επιτήρηση της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα, πραγματοποιείται από τον ΕΟΔΥ, κυρίως μέσω του Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης (ΣΥΔ) των περιστατικών HIV, των κρουσμάτων AIDS και των θανάτων.

Η δήλωση των περιστατικών AIDS αποτελούσε τον κυριότερο τρόπο παρακολούθησης της HIV λοίμωξης στις χώρες του δυτικού κόσμου, όπως και στην Ελλάδα έως το 1997. Ωστόσο, η χρήση των νέων ισχυρών και αποτελεσματικών αντιρετροϊκών θεραπειών που καθυστερούν την εμφάνιση του AIDS, έκανε αναγκαία την επέκταση του επιδημιολογικού συστήματος με τη δήλωση των ατόμων που ζουν με τον HIV. Η καταγραφή των ατόμων που ζουν με τον HIV, συγκρινόμενη με την καταγραφή των περιπτώσεων AIDS μόνο, παρέχει πληροφορίες που αφορούν σε πιο πρόσφατες μολύνσεις. Το ΣΥΔ των περιστατικών HIV/AIDS, παρά τις όποιες αδυναμίες, αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμο στην παρακολούθηση της επιδημίας και στον σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας και φροντίδας των ατόμων με HIV λοίμωξη.

Ορισμοί περιστατικών HIV / AIDS

AIDS: Οι περιπτώσεις AIDS που παρουσιάστηκαν στο δελτίο αυτό αξιολογήθηκαν βάσει του ευρωπαϊκού ορισμού του AIDS. Ο ορισμός αυτός αρχικά δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1982¹ και αναθεωρήθηκε τον Ιούνιο του 1985^{2,3} και τον Αύγουστο του 1987^{4,5}. Για τους εφήβους και τους ενήλικες (ηλικίας 13 ετών και άνω), ο ορισμός αναθεωρήθηκε τον Ιανουάριο του 1993^{6,7}. Η διαφορά σε σχέση με τον αντίστοιχο ορισμό που ισχύει στις ΗΠΑ είναι ότι δεν χρησιμοποιείται ως κριτήριο για την κατάταξη κάποιου περιστατικού ως κρούσμα AIDS ο αριθμός των CD4+ T-λεμφοκυττάρων. Για τα παιδιά, ο ορισμός που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη είναι ουσιαστικά ο ίδιος με αυτόν στις ΗΠΑ⁸.

Για τους σκοπούς της επιτήρησης, από τη στιγμή που ένα HIV θετικό άτομο πληροί τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού ορισμού του AIDS (κατηγορία C-CDC/1993), παραμένει σε αυτήν την κατηγορία ανεξάρτητα από τη μελλοντική κλινική του κατάσταση.

HIV: Για τους σκοπούς της επιδημιολογικής επιτήρησης, οι περιπτώσεις HIV ορίζονται βάσει

Technical Notes

Surveillance

In Greece, HIV surveillance is implemented by the National Public Health Organization (NPHO), mainly through the Mandatory Notification System (MNS) of HIV diagnoses, AIDS cases and deaths.

AIDS case reporting was the cornerstone of HIV surveillance in developed countries, including Greece, until 1997. However, highly active antiretroviral therapy delayed the onset of AIDS and necessitated the implementation of HIV case reporting. The new system provides information on more recent infections compared to AIDS reporting alone. In spite of some weaknesses, the HIV/AIDS MNS is useful for planning and evaluating public health and medical response.

HIV / AIDS case definitions

AIDS: AIDS cases in this report meet the European AIDS case definition, which was originally published in September 1982¹ and was revised in June 1985^{2,3} and in August 1987^{4,5}. For adults and adolescents (aged more than 13 years old), the European case definition was revised again in January 1993^{6,7}. This definition is not based on CD4+ T-cell count in contrast to the definition used in the USA. The paediatric definition in Europe is essentially the same as the one used in the USA⁸.

For surveillance purposes, once an HIV positive person meets the criteria of the European AIDS case definition (category C-CDC/1993), he/she remains in this category irrespectively of his/her future clinical condition.

HIV: In terms of surveillance, the case definition of HIV infection is based on laboratory criteria (Commission decision of 28/IV/2008). The number of

εργαστηριακών κριτηρίων (απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 28/IV/2008). Οι περιπτώσεις AIDS περιλαμβάνονται στα περιστατικά HIV. Για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 μηνών, χρειάζονται θετικά αποτελέσματα άμεσων δοκιμασιών ανίχνευσης του ιού σε δύο διαφορετικά δείγματα (εκτός του ομφαλοπλακουντιακού αίματος). Έφηβοι και ενήλικες θεωρούνται τα άτομα ηλικίας ίσης ή μεγαλύτερης των 13 ετών, ενώ παιδιατρικά περιστατικά θεωρούνται άτομα ηλικίας μικρότερης των 13 ετών.

Συλλογή και διαχείριση δεδομένων

Δήλωση κρουσμάτων AIDS: Η δήλωση των περιπτώσεων AIDS ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1984, και κατέστη υποχρεωτική, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α1/6122/19-9-1986.

Δήλωση περιστατικών HIV: Η δήλωση των ατόμων που ζουν με τον HIV ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1998, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Β1/5295/7-8-1998. Το συγκεκριμένο μέτρο για την επιδημιολογική επιτήρηση της HIV λοίμωξης εφαρμόστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον Ιανουάριο του 1999. Η δήλωση των ατόμων που διαγιγνώσκονταν με HIV ήταν ανώνυμη, απόρρητη και υποχρεωτική, και πραγματοποιείτο με τη χρήση των αρχικών του ονοματεπωνύμου ως ατομικών αναγνωριστικών, όπως και στις περιπτώσεις AIDS. Παρόλα αυτά, η εγγενής αδυναμία της σωστής και ακριβούς καταγραφής αυτών των αναγνωριστικών πιθανόν οδήγησε στην ύπαρξη κάποιων διπλοεγγραφών που δεν ήταν εφικτό να ανιχνευθούν.

Για λόγους επιδημιολογικής επιτήρησης, στατιστικής επεξεργασίας και προσδιορισμού των διαχρονικών τάσεων, έγινε αναδρομική συλλογή των διαθέσιμων στοιχείων για τις περιπτώσεις που η HIV λοίμωξη διαπιστώθηκε πριν το 1998. Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε μέσα στο 1999 με τη συνεργασία των Κέντρων Αναφοράς HIV/AIDS και των ΜΛ/ΕΙ.

Εθνικό Μητρώο Ασθενών με HIV λοίμωξη: Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 6110/Β/30.11.2022 «Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη – Ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων, των εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης», καταργήθηκαν οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις για την υποχρεωτική δήλωση και καταγραφή των περιστατικών HIV και των κρουσμάτων AIDS, και κατέστη υποχρεωτική η ένταξη

reported HIV infections includes AIDS cases. For children aged less than 18 months at diagnosis, positive results of direct HIV testing on two separate specimens (excluding cord blood) are required. Adult/adolescent cases are people aged ≥ 13 years, while paediatric cases are younger than 13 years old.

Data collection and management

AIDS cases reporting: AIDS case reporting started in Greece in 1984 and became mandatory by Ministerial Decision Α1/6122/19-9-1986.

HIV cases reporting: HIV case reporting started in Greece in 1998, in accord with Ministerial Decision Β1/5295/7-8-1998. The new HIV surveillance system was implemented at European level in January, 1999. HIV cases reporting was anonymous, mandatory and confidential. Name and surname initials were used as personal identifiers to eliminate duplicate reports. Inherent limitations in this process resulted in some duplicates that couldn't be detected.

For surveillance and trend analysis purposes, cases of HIV infection diagnosed before 1998 have been retrospectively reported to the NPHO. This effort was completed in 1999 in collaboration with the HIV/AIDS Reference Centres and the Infectious Disease Units/Outpatients Clinics for HIV (+) individuals.

National HIV Registry: After the publication of the Official Gazette 6110/Β/30.11.2022 "Establishment of the National Registry of Patients with HIV infection - Electronic prescription of antiretroviral drugs, laboratory tests for the quantitation of HIV-1 RNA and other tests to monitor HIV infection", the above ministerial decisions for the mandatory declaration and registration of HIV cases and AIDS cases were repealed, and it became mandatory to record all persons with a positive laboratory confirmatory test for HIV in the National Registry of Patients with HIV infection.

όλων των ατόμων με θετικό εργαστηριακό επιβεβαιωτικό έλεγχο για HIV στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών με HIV λοίμωξη.

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω του ΣΥΔ.

Συγκεκριμένα, **από την έναρξη λειτουργίας του ΣΥΔ έως και τις 04/04/2023**, για τις δηλώσεις των περιστατικών, χρησιμοποιήθηκαν τυποποιημένα έντυπα του ΕΟΔΥ, μέσω των οποίων εξασφαλίστηκε η ομοιογένεια των δεδομένων.

Η αποστολή των δηλώσεων πραγματοποιήθηκε από τις Μονάδες Λοιμώξεων (ΜΛ), τα Εξωτερικά Ιατρεία (ΕΙ) παρακολούθησης ατόμων που ζουν με τον HIV, τα Κέντρα Αναφοράς και Ελέγχου HIV/AIDS, τα Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία της χώρας. Τα δεδομένα καταγράφηκαν στο ηλεκτρονικό Αρχείο HIV/AIDS του ΕΟΔΥ από προσωπικό του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS και της Διεύθυνσης Πρόληψης & Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS, ΣΜΝ & Ηπατιτίδων του ΕΟΔΥ, στο Αρχείο HIV που τηρείτο στη Διεύθυνση Πρόληψης & Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS, ΣΜΝ & Ηπατιτίδων του ΕΟΔΥ, κατόπιν ελέγχου ως προς την πληρότητα και ορθότητά τους.

Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου HIV στις 05/04/2023, σύμφωνα με το ΦΕΚ 6110/Β/30.11.2022 «Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη – Ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων, των εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης», ως συστήματος αρχειοθέτησης δεδομένων του άρθρου 4 στοιχ.(6) του ΓΚΠΔ, στο οποίο μετέπεσαν τα δεδομένα που είχαν καταγραφεί έως και τις 04/04/2023 στο Αρχείο HIV του ΕΟΔΥ, η καταχώριση όλων των δεδομένων πραγματοποιείται απευθείας από τους διαπιστευμένους χρήστες του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη, οι οποίοι έχουν καθοριστεί ως εξής: υπεύθυνοι καταχώρισης στο Μητρώο, χρήστες εργαστηριακής διερεύνησης και θεράποντες ιατροί.

Τα αποτελέσματα της παρούσας αναφοράς προέκυψαν κατόπιν ανάλυσης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών με HIV λοίμωξη, τα οποία αφορούν στο σύνολο των εγγραφών του Αρχείου HIV του ΕΟΔΥ και στα περιστατικά που καταγράφηκαν στο Εθνικό Μητρώο HIV από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του στις 05/04/2023.

Data collection is implemented through the MNS.

Specifically, **from the start of operation of the MNS, until 04/04/2023**, for cases reporting, standardized reporting forms were used to maximize the homogeneity of collected data.

Data were reported by Infectious Disease Units, Outpatients clinics for HIV infected patients, HIV/AIDS Reference & Control Centres and Hospitals. The collected data were managed by the personnel of HIV/AIDS Surveillance Department and HIV/AIDS, STIs & Hepatitis Prevention & Surveillance Directorate of the N.P.H.O., which performed the necessary checks regarding completeness and correctness of the case reports and recorded them in the HIV Registry of NPHO.

From the start of the operation of the National HIV Registry on 05/04/2023, according to the Official Gazette 6110/Β/30.11.2022 "Establishment of the National Registry of Patients with HIV infection - Electronic prescription of antiretroviral drugs, laboratory tests for the quantitation of HIV-1 RNA and other tests to monitor HIV infection", as a data archiving system of Article 4 item (6) of the GDPR, to which the data recorded up to 04/04/2023 in the NPHO HIV Archive were transferred, the registration of all data is carried out directly by the accredited users of the National Registry of Patients with HIV infection, which are defined as follows: Registry registrants, laboratory investigation users and attending physicians.

The results of the present report were calculated through the synthesis of data of the National Registry of patients with HIV infection, which includes all the records of the HIV Archive of the NPHO and the cases recorded in the National HIV Registry since the start of its operation on 05/04/2023.

Η συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του HIV/AIDS, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) (ΕΕ) 2016/679, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον ν.4624, ΦΕΚ Α 137/29-8-2019.

Παρουσίαση δεδομένων

Η παρουσίαση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση πινάκων και σχημάτων ανά έτος, βιολογικό φύλο (φύλο κατά τη γέννηση), κατηγορία μετάδοσης, ηλικιακή ομάδα και εθνικότητα.

AIDS: Η επεξεργασία των στοιχείων για όλες τις κατηγορίες πραγματοποιήθηκε με βάση το έτος διάγνωσης.

HIV: Η επεξεργασία των δεδομένων για όλες τις κατηγορίες πραγματοποιήθηκε με βάση το έτος διάγνωσης.

Φύλο

Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το φύλο κατά τη γέννηση. Ωστόσο, για την επιδημιολογική επιτήρηση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων αναφέρονται και τα διεμφυλικά άτομα.

Κατηγορίες μετάδοσης

Εάν αναφέρονταν περισσότεροι από έναν πιθανό τρόπο μόλυνσης για ένα περιστατικό, καταγράφηκε μόνο ο πλέον πιθανός τρόπος μόλυνσης.

Τα ήδη δημοσιευμένα στοιχεία ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που καταγράφηκαν. Για παράδειγμα, είναι πιθανό να έχουν επαναταξινομηθεί περιπτώσεις που είχαν χαρακτηριστεί αρχικά ως "απροσδιόριστες" ως προς τον τρόπο μόλυνσης, εάν προέκυψαν νέες πληροφορίες στη συνέχεια.

Εγκυρότητα - Πληρότητα δεδομένων

Το ποσοστό πληρότητας των δεδομένων που αφορούν στα περιστατικά HIV και τα κρούσματα AIDS στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά υψηλό λόγω της ελεγχόμενης νοσοκομειακής χορήγησης της αντιρετροϊκής θεραπείας και της διενέργειας επιβεβαιωτικού ελέγχου HIV σε Κέντρα Αναφοράς/Εξειδικευμένα Εργαστήρια HIV, μόνο με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση του σχετικού

The collection, management and processing of sensitive personal data collected in the context of the HIV/AIDS surveillance, was carried out in accordance with the regulations of the General Data Protection Regulation (GDPR) (EE) 2016/679 which has been integrated into national legislation by law 4624, FEK A 137/29-8-2019.

Data presentation

Tables and figures by year, sex assigned at birth, transmission category, age group and country of origin were used for data presentation.

AIDS: AIDS data for all categories were presented by year of diagnosis.

HIV: HIV data for all categories were presented by year of diagnosis.

Sex

For the statistical analysis, the sex assigned at birth was used. However, for epidemiological surveillance, and interpretation of the results, transgendered people are also mentioned.

Transmission mode

If more than one route of HIV transmission were reported for one person, the most likely route was recorded.

Already published surveillance data may have been modified, according to the updated information. For instance, cases initially classified as undetermined, regarding the route of HIV transmission, might have been reclassified if new information became available.

Data validity and completeness

The completeness of the data related to HIV and AIDS cases in Greece is extremely high due to the monitored hospital administration of antiretroviral treatment and the performance of HIV confirmatory testing in Reference Centers/Specialized HIV Laboratories, only with the electronic prescription of the relevant referral, through which all persons with a

παραπεμπτικού, μέσω του οποίου όλα τα άτομα με θετικό εργαστηριακό επιβεβαιωτικό έλεγχο για HIV εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών με HIV λοίμωξη (ΦΕΚ 6110/Β/30.11.2022).

Λόγω της συστηματικής και διαχρονικής παρακολούθησης των ασθενών σε ΜΛ & ΕΙ, τα δεδομένα που αφορούν στο σύνολο των ατόμων που βρίσκονται υπό αντιρετροϊκή αγωγή εμφανίζουν μεγάλη πληρότητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασθενείς βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το ιατρικό προσωπικό, γεγονός που καθιστά δυνατή τη συλλογή, επιβεβαίωση ή διόρθωση των δεδομένων. Ωστόσο, όσον αφορά στα περιστατικά που διαγνώστηκαν την περίοδο 2023-2024, και καταχωρίστηκαν στο Εθνικό Μητρώο HIV, το οποίο άρχισε να λειτουργεί από τις 05/04/2023, από τους θεράποντες ιατρούς, παρατηρήθηκαν χαμηλότερα ποσοστά πληρότητας συγκεκριμένων παραμέτρων [εθνικότητα (το 2023), πιθανός τρόπος μετάδοσης, τιμή CD4-T λεμφοκυττάρων κατά τη διάγνωση], συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη.

Αυτό που διαφοροποιήθηκε από το 2023, ήταν η διαδικασία καταχώρισης των περιστατικών HIV και AIDS. Συγκεκριμένα, πριν την έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου HIV, η δήλωση των περιστατικών HIV και AIDS πραγματοποιείτο μέσω της αποστολής των ειδικά διαμορφωμένων εντύπων, τα οποία καταχωρούνταν στο Αρχείο HIV του ΕΟΔΥ κατόπιν διενέργειας ελέγχου ως προς την πληρότητα και ορθότητά τους από το προσωπικό του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS και της Διεύθυνσης Πρόληψης & Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS, ΣΜΝ & Ηπατιτίδων του ΕΟΔΥ, στο Αρχείο HIV που τηρείτο στη Διεύθυνση Πρόληψης & Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS, ΣΜΝ & Ηπατιτίδων του ΕΟΔΥ, το οποίο επικοινωνούσε απευθείας με τους θεράποντες ιατρούς στις περιπτώσεις ελλειπών ή μη ορθής συμπλήρωσης των δεδομένων. Από την έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου, η καταγραφή των περιστατικών πραγματοποιείται απευθείας από τους θεράποντες ιατρούς.

Καμία διόρθωση δεν έχει γίνει σχετικά με τα περιστατικά που δεν δηλώθηκαν, και, κυρίως, για τα περιστατικά, των οποίων η HIV οροθετικότητα δεν ήταν γνωστή ούτε στους ίδιους τους ασθενείς. Συνεπώς, η πληρότητα των δηλώσεων δεν μπορεί να εξακριβωθεί.

positive laboratory confirmatory test for HIV are included in the National Register of Patients with HIV infection (Government Gazette 6110/B/30.11.2022).

Information about PLHIV who are on treatment is comprehensive. This is attributed to the continuous interaction and communication between patients and their physicians, which allows the collection of valuable epidemiological information, real time corrections and the validation of reported data.

However, the cases diagnosed during 2023-2024 and registered by the attending physicians in the National HIV Registry, which became operational from 05/04/2023, were characterized by lower rates of completeness of specific parameters [ethnicity (in 2023), possible mode of transmission, CD4-T lymphocyte levels at the time of HIV diagnosis), compared to previous years.

In 2023 the process of registering HIV and AIDS cases changed. Specifically, before the start of the operation of the National HIV Registry, the notification of HIV and AIDS cases was carried out by sending certain reporting forms to the NPHO. The personnel of NPHO recorded the data included in the reporting forms, after checking them for completeness and correctness. In case of incomplete or incorrect data a direct communication with the attending physicians was performed. Since the beginning of the operation of the National HIV Registry, the recording of the cases is carried out directly by the attending physicians.

There has been no adjustment for unreported cases including those who are unaware of their infection. Therefore, the completeness of HIV data reporting cannot be estimated.

Βιβλιογραφία - References

1. Centers for Disease Control. Update on acquired immune deficiency syndrome (AIDS) - United States. Morbidity and Mortality Weekly Report, 1982; 31: 507-14.
2. Centers for Disease Control. Revision of the case definition of acquired immunodeficiency syndrome for national reporting - United States. Morbidity and Mortality Weekly Report, 1985; 34: 373-5.
3. World Health Organization. WHO/CDC case definition for AIDS. Weekly Epidemiological Record, 1986; 61: 69-72.
4. Centers for Disease Control. Revision of the CDC surveillance case definition for acquired immunodeficiency syndrome. Morbidity and Mortality Weekly Report, 1987; 36: n°1S.
5. World Health Organization. 1987 revision of CDC/WHO case definition for AIDS. Weekly Epidemiological Record, 1988; 63: 1-7.
6. Ancelle-Park R. Expanded European AIDS case definition. Lancet, 1993; 341: 441.
7. European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS. 1993 revision of the European AIDS surveillance case definition. AIDS Surveillance in Europe, Quarterly Report, 1993; n° 37: 23-28.
8. European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS. European case definition for AIDS surveillance in children - revision 1995. HIV/AIDS Surveillance in Europe, Quarterly Report, 1995; n° 48: 46-53.