



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Συγχορήγηση εμβολίων

Τα εμβόλια που περιέχουν αντιγόνα (π.χ. ηπατίτιδας Β, γρίπης) ή τα πολυσακχαριδικά εμβόλια (μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας A,C,W135,Y, τυφοειδούς πυρετού) καθώς και τα εμβόλια που περιέχουν νεκρούς, αδρανοποιημένους ιούς ή βακτήρια (ηπατίτιδας Α, λύσσας, πολιομυελίτιδας, χολέρας, Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας και εγκεφαλίτιδας από κρότωνες), μπορούν να χορηγηθούν ταυτόχρονα, χωρίς να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητά τους ή να αυξάνεται ο αριθμός των ανεπιθύμητων ενεργειών τους.

Τα εμβόλια που περιέχουν ζώντες εξασθενημένους ιούς (κίτρινου πυρετού, ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς και ανεμευλογιάς) συνιστάται να γίνεται είτε την ίδια ημέρα είτε μετά από 4 εβδομάδες.

Τα εμβόλια που περιέχουν αδρανοποιημένους μικροοργανισμούς μπορούν να χορηγηθούν μαζί με τα εμβόλια που περιέχουν ζώντες μικροοργανισμούς.

Όταν τα εμβόλια που χορηγούνται ταυτόχρονα, ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας διαφορετική σύριγγα και σε διαφορετικά σημεία.

Συγκεκριμένα όσον αφορά το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με τα εμβόλια με ζώντα εξασθενημένα στελέχη, διαφορετικά συστήνεται μεταξύ των δύο εμβολιασμών να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων. Τα εμβόλια που περιέχουν αδρανοποιημένα αντιγόνα, μπορούν να χορηγηθούν ταυτόχρονα με το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού, χωρίς να τροποποιείται η ανοσολογική απάντηση στα εμβόλια και χωρίς να αυξάνονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Λόγω πιθανής επίδρασης του εμβολίου στην ανοσολογική απάντηση στη φυματίνη της δοκιμασίας Mantoux, αυτή θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες μετά από τον εμβολιασμό.