

## **ΜΕΛΙΟΕΙΔΩΣΗ / ΜΑΛΗ**

### Κλινική περιγραφή

Η μελιοείδωση, που ενδημεί κυρίως στην Ινδία και τη Ν.Α. Ασία, οφείλεται στη *Pseudomonas pseudomallei* και μπορεί να λάβει τέσσερις κλινικές μορφές. Η σηψαιμική μορφή χαρακτηρίζεται από συστηματικά συμπτώματα όπως πυρετός, μυαλγίες, καφαλαλγία, διάρροια και στη συνέχεια ερύθημα προσώπου, φλυκταινώδες εξάνθημα, λεμφαδενοπάθεια, πολυοργανική ανεπάρκεια. Η πνευμονική μορφή εκδηλώνεται με πυρετό, ρίγος, λεμφαδενοπάθεια, φυμαλιώδες ή φλυκταινώδες εξάνθημα και προσβολή του πνευμονικού παρεγχύματος (βρογχοπνευμονία έως νεκρωτική πνευμονία). Στην εντοπισμένη μορφή παρουσιάζεται τοπική φλεγμονή με σχηματισμό έλκους και λευκωπών ή φαιών οζιδίων και σύστοιχη λεμφαδενίτιδα. Η χρόνια πυώδης μορφή μπορεί να εκδηλωθεί έως πολλά χρόνια μετά την έκθεση με αποστήματα του δέρματος, των σκελετικών μυών, του σπλήνα ή του ήπατος. Η μάλη είναι κυρίως νόσος των αλόγων που οφείλεται στη *Pseudomonas mallei* και μόνο κατ' εξαίρεση μπορεί να προσβάλλει τον άνθρωπο με εκδηλώσεις όμοιες με αυτές της εντοπισμένης και της χρόνιας πυώδους μορφής της μελιοείδωσης.

### Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση

- Απομόνωση του υπεύθυνου παθογόνου από οποιοδήποτε κλινικό δείγμα.

### Κατάταξη του κρούσματος

#### **Επιβεβαιωμένο**

Κρούσμα με συμβατή κλινική εικόνα, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.