

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Αζερμπαϊτζάν</b>	Υπάρχει κίνδυνος από Μάιο-Οκτώβρη σε αγροτικές περιοχές σε υψόμετρο <1.500μ (4,921 ft). Στο Baku δεν υπάρχει κίνδυνος. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 100%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, χλωροκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.
<b>Αίγυπτος</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Αιθιοπία</b>	Σε όλη τη χώρα σε υψόμετρο <2.500μ (8,202 ft), εκτός από την Αντίς Αμπέμπα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 76%, <i>P. vivax</i> 24%, <i>P. malariae</i> και <i>P. ovale</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Ακτή Ελεφαντοστού</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. ovale</i> 5%–10%, <i>P. Vivax</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Αλβανία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Αλγερία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ανγκόλα</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 90%, <i>P. ovale</i> 5%, <i>P. vivax</i> 5%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Ανδόρα</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ανταρκτική</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Αργεντινή</b>	Σε αγροτικές περιοχές στη βόρεια επαρχία Salta (κατά μήκος των συνόρων με τη Βολιβία). Σπάνια αναφέρονται κρούσματα στην πόλη Puerto Iguazú στην Επαρχία Misiones. Δεν υπάρχει κίνδυνος στους καταρράκτες Iguassu. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι πολύ χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 100%.	Στην Επαρχία Salta: Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, χλωροκίνη. Στην Επαρχία Misiones: μόνο γενικά προληπτικά μέτρα για την προστασία από τα κουνούπια. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.
<b>Αρμενία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Αυστραλία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Αυστρία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Αφγανιστάν</b>	Από τον Απρίλιο έως το Δεκέμβριο σε όλες τις περιοχές σε υψόμετρο < 2.000μ (6,561ft). Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 80%-90%, <i>P. falciparum</i> 10%-20%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Βέλγιο</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Βενεζουέλα</b>	Σε αγροτικές περιοχές των πολιτειών Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolivar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre και Zulia. Κίνδυνος υπάρχει στους καταρράκτες Angel. Δεν υπάρχει κίνδυνος στο νησί Margarita. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 83%, <i>P. falciparum</i> 17%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Βιετνάμ</b>	Σε αγροτικές περιοχές μόνο, εκτός από το Δέλτα του Κόκκινου Ποταμού και των παράκτιων περιοχών του βόρειου Nha Trang. Σπάνια αναφέρονται κρούσματα στο Δέλτα Mekong. Κανένας κίνδυνος στις περιοχές Da Nang, Hai Phong, Hanoi, Ho Chi Minh City (Saigon), Nha Trang και Qui Nhon. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 50%–90%, το υπόλοιπο <i>P. vivax</i> .	Στο νότιο τμήμα της χώρας στις περιοχές Dac Lac, Gia Lai, Khanh Hoa, Kon Tum, Lam Dong, Ninh Thuan, Song Be, Tay Ninh: ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη. Σε άλλες περιοχές εκτός από το Δέλτα Mekong: ατοβακόνη-προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Στο Δέλτα Mekong: μόνο γενικά προληπτικά μέτρα για την προστασία από τα κουνούπια. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: μεφλοκίνη, χλωροκίνη.
<b>Βιρμανία (Μπούρμα)</b>	Σε αγροτικές περιοχές όλης της χώρας σε υψόμετρο <1.000μ (3,281 ft). Κανένας κίνδυνος στις πόλεις Rangoon (Yangon) και Mandalay. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 80%, <i>P. vivax</i> 20%.	Στις πολιτείες Bago, Kayah, Kayin, Kachin, Shan, και Tanintharyi: δοξουκυκλίνη, ατοβακόνη/προγουανίλη. Σε όλες τις άλλες περιοχές: δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, ατοβακόνη/προγουανίλη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: μεφλοκίνη, χλωροκίνη.
<b>Βολιβία</b>	Κίνδυνος σε όλη τη χώρα σε υψόμετρο <2.500 μ (8,202 ft). Δεν υπάρχει κίνδυνος στην πόλη La Paz. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 91%, <i>P. falciparum</i> 9%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Βόρεια Κορέα</b>	Κίνδυνος σε νότιες επαρχίες. Είδος πλασμοδίου: 100% <i>P. vivax</i> .	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, χλωροκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.
<b>Βοσνία-Ερζεγοβίνη</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Βουλγαρία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Βραζιλία</b>	Κίνδυνος υπάρχει στις πολιτείες Acre, Amará, Amazonas, Mato Grosso, Para, Rondonia, Roraima, Tocantins και το δυτικό τμήμα του Maranhão. Επίσης σε αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων πόλεων όπως οι Boa Vista, Macara, Manaus, Maraba, Porto Velho και Santarem. Σπάνια αναφέρθηκαν κρούσματα στο Belem. Δεν υπάρχει κίνδυνος στους καταρράκτες Iguassu. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 75%, <i>P. falciparum</i> 25%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Στην πόλη Belem: μόνο γενικά προληπτικά μέτρα για την προστασία από τα κουνούπια. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Γαλλία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Γαλλική Γουιάνα</b>	Σε όλη τη χώρα, εκτός από την πόλη Cayenne ή το νησί Devil (Ile du Diable). Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> <50%, <i>P. vivax</i> το υπόλοιπο, <i>P. malariae</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Γαλλική Πολυνησία, και τα νησιά Tahiti, Moorea, Marquesas (Hiva Oa, Ua Huka), Austral (Tubuai, Rurutu)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Γερμανία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Γεωργία</b>	Κίνδυνος από Ιούνιο-Οκτώβριο στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, κυρίως στις περιοχές Kakheti και Kvemo Kartli. Δεν υπάρχει κίνδυνος στο Tbilisi. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι πολύ χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 100%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, χλωροκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Γιβραλτάρ (Ηνωμένο Βασίλειο)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Γκάμπια</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμώδιου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i> , <i>P. vivax</i> 15% σε συνδυασμό.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Γκαμπόν</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμώδιου: <i>P. falciparum</i> 95%, <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i> , <i>P. vivax</i> 5% σε συνδυασμό.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Γκάνα</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμώδιου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. ovale</i> 5%–10%, <i>P. vivax</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Γουατεμάλα</b>	Σε αγροτικές περιοχές μόνο σε υψόμετρο < 1.500μ (4,921ft). Κανένας κίνδυνος στην πόλη Γουατεμάλα, στην Antigua ή τη Λίμνη Atitlán. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμώδιου: <i>P. vivax</i> 97%, <i>P. falciparum</i> 3%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, χλωροκίνη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.
<b>Γουϊάνα</b>	Κίνδυνος σε όλες τις περιοχές σε υψόμετρο < 900μ (2,953 ft) και στη Georgetown. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμώδιου: <i>P. falciparum</i> 50%, <i>P. vivax</i> 50%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Γουϊνέα</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμώδιου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. ovale</i> 5%–10%, <i>P. vivax</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Γουϊνέα-Μπισό</b>	Σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχουν δεδομένα για το σχετικό κίνδυνο για τον ταξιδιώτη. Είδος πλασμώδιου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. ovale</i> 5%–10%, <i>P. vivax</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Γρενάδα</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Γροιλανδία (Δανία)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Δανία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i> και <i>P. vivax</i> 15% σε συνδυασμό.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Δημοκρατία του Κονγκό (Ζαΐρ)</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 90%, <i>P. ovale</i> 5-10%, <i>P. vivax</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Δομινικανική Δημοκρατία</b>	Σε όλη τη χώρα (συμπεριλαμβάνονται περιοχές με τουριστικά θέρετρα), εκτός από τις πόλεις Santiago και Santo Domingo. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 100%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, χλωροκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.
<b>Δομίνικος</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Δυτική Σαχάρα</b>	Σπάνια αναφέρονται κρούσματα. Δεν υπάρχουν δεδομένα για τον σχετικό κίνδυνο για τον ταξιδιώτη. Είδος πλασμοδίου: Άγνωστο	Συνιστώνται μόνο γενικά προληπτικά μέτρα για την προστασία από τα κουνούπια. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Εκουαδór (και τα νησιά Galápagos)</b>	Κίνδυνος σε όλες τις περιοχές σε υψόμετρο < 1.500μ (4,921ft). Δεν υπάρχει κίνδυνος στις πόλεις Guayaquil, Quito και στα νησιά Galápagos. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 90%, <i>P. falciparum</i> 10%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Ελβετία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ελλάδα</b>	Για την επιδημιολογική εικόνα της νόσου μπορείτε να ενημερωθείτε στο: <a href="http://www.keelpno.gr/el-gr/malariahighlight.aspx">http://www.keelpno.gr/el-gr/malariahighlight.aspx</a>	Για τα κατάλληλα μέτρα προστασίας μπορείτε να ενημερωθείτε στο: <a href="http://www.keelpno.gr/el-gr/malariahighlight.aspx">http://www.keelpno.gr/el-gr/malariahighlight.aspx</a>

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Ελ-Σαλβαδόρ</b>	Στις αγροτικές περιοχές των Ahuacharán, La Unión και Santa Ana. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 99%, <i>P. falciparum</i> <1%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, χλωροκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.
<b>Ερυθραία</b>	Σε όλη τη χώρα σε υψόμετρο <2.200μ (7,218ft). Κανένας κίνδυνος στην Asmara. Δεν υπάρχουν δεδομένα για τον σχετικό κίνδυνο για τον ταξιδιώτη. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. vivax</i> 10%-15%, <i>P. ovale</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Εσθονία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ζάμπια</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> >90%, <i>P. vivax</i> έως 5%, <i>P. ovale</i> έως 5%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Ζιμπάμπουε</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> >90%, <i>P. vivax</i> έως 5%, <i>P. ovale</i> έως 5%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Η.Π.Α.</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ηνωμένο Βασίλειο (και τα νησιά Channel, Isle of Man)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ιαπωνία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Ινδία</b>	Σε όλη τη χώρα, και στις πόλεις Βομβάη και Νέο Δελχί, εκτός από περιοχές σε υψόμετρο >2.000μ (6,561 ft) στις επαρχίες Himachal Pradesh, Jammu, Kashmir και Sikkim. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 40%, <i>P. falciparum</i> 20%–40%, το υπόλοιπο <i>P. malariae</i> και <i>P. ovale</i> .	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Ινδονησία</b>	Στις αγροτικές περιοχές των Kalimantan (Borneo), Nusa Tenggara Barat (συμπεριλαμβανομένου και της νήσου Lombok), Sulawesi και Sumatra. Κίνδυνος υπάρχει σε όλες τις περιοχές της ανατολικής Ινδονησίας (επαρχίες των Irian Jaya Barat, Maluku, και Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, και Papua Indonesia). Κανένας κίνδυνος στη Jakarta, στις τουριστικές περιοχές στο Bali και τη Java. Χαμηλός κίνδυνος υπάρχει στις αγροτικές περιοχές της Java. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 66%, το υπόλοιπο κυρίως <i>P. vivax</i> .	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη ( <i>P. falciparum</i> και <i>P. vivax</i> ).
<b>Ιορδανία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ιράκ</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ιράν</b>	Κίνδυνος υπάρχει στις αγροτικές περιοχές στην επαρχία Sistan- Baluchestan, στο νότιο τροπικό τμήμα των επαρχιών Hormozgan και Kerman, και επίσης στο Ardabil και στις επαρχίες East Azerbaijan βόρεια της οροσειράς Zagros από το Μάρτιο έως το Νοέμβριο. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι πολύ χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 88%, <i>P. falciparum</i> 12%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Ιρλανδία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται



## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Ισημερινή Γουϊνέα</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i> και <i>P. vivax</i> 15% σε συνδυασμό.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Ισλανδία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ισπανία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ισραήλ</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ιταλία (και το Holy See)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Καζακστάν</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Καμερούν</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 80%, <i>P. ovale</i> 5%–10%, <i>P. vivax</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Καμπότζη</b>	Σε όλη τη χώρα εκτός από το συγκρότημα ναών Angkor Wat, Phnom Penh και γύρω από τη λίμνη Tonle Sap. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 86%, <i>P. vivax</i> 12%, <i>P. malariae</i> 2%.	Στις επαρχίες Banteay Meanchey, Battambang, Koh Kong, Odder Meanchey, Pailin, Kampot, Preah Vihear, Pursat και Siemreap στα σύνορα με την Ταϊλάνδη: ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη. Στις υπόλοιπες ενδημικές περιοχές συνιστάται δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, ατοβακόνη/προγουανίλη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: μεφλοκίνη, χλωροκίνη.
<b>Καναδάς</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Κατάρ</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Κένυα</b>	Σε όλη τη χώρα (και στα game parks) σε υψόμετρο < 2.500μ (8,202ft). Κανένας κίνδυνος στο Ναϊρόμπι. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. vivax</i> 5%–10%, <i>P. ovale</i> έως 5%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Κίνα</b>	Στις αγροτικές περιοχές των επαρχιών Anhui, Guizhou, Hainan, Henan, Hubei και Yunnan. Σπάνια αναφέρονται κρούσματα, από το Μάιο έως το Δεκέμβριο, σε άλλες αγροτικές περιοχές της χώρας σε υψόμετρο < 1.500μ (4,921 ft). Δεν υπάρχει κίνδυνος σε αστικές περιοχές. Κρουαζιέρες στο ποτάμι μπορεί να διασχίσουν ενδημικές περιοχές στις επαρχίες Anhui και Hubei. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> κυρίως, <i>P. falciparum</i> σε συγκεκριμένες περιοχές.	Στα σύνορα με τη Βιρμανία, στο δυτικό τμήμα της επαρχίας Yunnan: ατοβακόνη/ προγουανίλη, δοξουκυκλίνη. Στην επαρχία Hainan και σε άλλες περιοχές στη Yunnan: ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Επαρχίες Anhui, Guizhou, Henan και Hubei: ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, χλωροκίνη. Στις υπόλοιπες ενδημικές περιοχές και στις κρουαζιέρες που διασχίζουν ενδημικές περιοχές συνιστώνται μόνο γενικά προληπτικά μέτρα για την προστασία από τα κουνούπια. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: μεφλοκίνη, χλωροκίνη.
<b>Κιργιστάν</b>	Σε περιοχές στα σύνορα με το Τατζικιστάν. Δεν έχουν αναφερθεί κρούσματα στην πρωτεύουσα Bishkek. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι πολύ χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 99%, <i>P. falciparum</i> σπάνια εισαγόμενα κρούσματα.	Συνιστώνται μόνο γενικά προληπτικά μέτρα για την προστασία από τα κουνούπια. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.
<b>Κολομβία</b>	Σε όλες τις αγροτικές περιοχές σε υψόμετρο < 1.700μ (5,577 ft). Δεν υπάρχει κίνδυνος στη Bogotά και στη Cartagena. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 35–40%, <i>P. vivax</i> 60–65%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Κονγκό (Brazzaville)</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 90%, <i>P. ovale</i> 5–10%, <i>P. vivax</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Κόσοβο</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Κόστα Ρίκα</b>	Στην επαρχία Limón. Δεν υπάρχει κίνδυνος στην πόλη Limón (Puerto Limón). Σπάνια αναφέρονται κρούσματα σε άλλες περιοχές της χώρας. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμωδίου: <i>P. vivax</i> 100%.	Στην επαρχία Limón: ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, χλωροκίνη. Στις υπόλοιπες περιοχές συνιστώνται τα γενικά προληπτικά μέτρα για την προστασία από τα κουνούπια. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.
<b>Κούβα</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Κουβέιτ</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Κροατία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Κύπρος</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Λαϊκή Δημοκρατία του Ανατολικού Τιμόρ (Λέστε)</b>	Σε όλη τη χώρα. Είδος πλασμωδίου: <i>P. falciparum</i> 50%, <i>P. vivax</i> 50%, <i>P. ovale</i> <1%, <i>P. malariae</i> <1%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Λάος</b>	Σε όλη τη χώρα, εκτός της πόλης Vientiane. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι πολύ χαμηλός. Είδος πλασμωδίου: <i>P. falciparum</i> 95%, <i>P. vivax</i> 4%, <i>P. malariae</i> και <i>P. ovale</i> 1% σε συνδυασμό.	Στα σύνορα Λάος-Βιρμανία στις επαρχίες Βοκέο και Louang Namtha και στα σύνορα Λάος-Ταϊλάνδη στις επαρχίες Saravane και Champasack: ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη. Στις υπόλοιπες ενδημικές περιοχές: ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: μεφλοκίνη, χλωροκίνη.
<b>Λεσότο</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Λεττονία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Λευκορωσία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Λίβανος</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Λιβερία</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. ovale</i> 5%-10%, <i>P. vivax</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Λιβύη</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Λιθουανία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Λιχτενστάϊν</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Λουξεμβούργο</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Μαδαγασκάρη</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. vivax</i> 5%-10%, <i>P. ovale</i> 5%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Μακάο (Κίνα)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Μαλαισία</b>	Κίνδυνος σε αγροτικές περιοχές στο Βόρνεο της Μαλαισίας (επαρχίες Sabah και Sarawak) και λιγότερο σε αγροτικές περιοχές στη Χερσόνησο. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 40%, <i>P. vivax</i> 50%, το υπόλοιπο <i>P. malariae</i> , <i>P. knowlesi</i> και <i>P. ovale</i> . Το <i>P. knowlesi</i> αναφέρεται να προκαλεί το 28% των κρουσμάτων στο Sarawak και προκαλεί κρούσματα και στο Βόρνεο και στη Χερσόνησο.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Μαλάουι</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 90%, <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i> και <i>P. vivax</i> 10% σε συνδυασμό.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Μαλδίβες</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Μάλι</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. ovale</i> 5%-10%, <i>P. vivax</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Μάλτα</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Μαρόκο</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Μαυρίκιος</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Μαυριτανία</b>	Στις νότιες επαρχίες, εκτός από τις περιοχές Dakhlet-Nouadhibou, Inchiri και Tiris-Zemmour. Δεν υπάρχουν δεδομένα για το σχετικό κίνδυνο για τον ταξιδιώτη. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. ovale</i> 5%-10%, <i>P. vivax</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Μαυροβούνιο</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Μεξικό</b>	Στην πολιτεία Chiapas και σε αγροτικές περιοχές των πολιτειών Nayarit, Oaxaca και Sinaloa. Κίνδυνος υπάρχει στην περιοχή που ορίζεται μεταξύ 24° Β και 28° Β γεωγραφικού πλάτους και μεταξύ 106°Δ και 110° Δ γεωγραφικού μήκους, που εκτείνεται σε τμήματα των πολιτειών Durango, Chihuahua και Sonora. Σπάνια αναφέρονται κρούσματα στις πολιτείες Quintana Roo και Tabasco. Δεν ενδημεί η ελονοσία κατά μήκος των συνόρων με τις Η.Π.Α. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 100%.	Στις ενδημικές περιοχές, εκτός από τις πολιτείες Quintana Roo και Tabasco: ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, χλωροκίνη. Στις πολιτείες Quintana Roo και Tabasco: συνιστώνται τα γενικά προληπτικά μέτρα για την προστασία από τα κουνούπια. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.
<b>Μικρονησία (και τα νησιά Yap, Rohnpei, Chuuk, Kosrae)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Μογγολία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Μοζαμβίκη</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 98%, <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i> 2%, <i>P. vivax</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Μολδαβία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Μονακό</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Μπαγκλαντές</b>	Σε όλη τη χώρα, εκτός από την Dhaka. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: >50% <i>P. falciparum</i> , το υπόλοιπο <i>P. vivax</i> .	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Μπαχάμες</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Μπαχρέιν</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Μπελιζ</b>	Σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στις περιοχές Cayo, Stann Creek και Toledo. Δεν υπάρχει κίνδυνος στην πόλη Μπελιζ και στα νησιά που επισκέπτονται οι τουρίστες. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 100%.	Στις περιοχές Cayo, Stann, Creek και Toledo: ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, χλωροκίνη. Στις υπόλοιπες ενδημικές περιοχές: συνιστώνται τα γενικά προληπτικά μέτρα για την προστασία από τα κουνούπια. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.
<b>Μπενίν</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. ovale</i> 5%–10%, <i>P. vivax</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Μποτσουάνα</b>	Στις περιοχές Central, Chobe, Ghanzi, Northeast και Northwest. Δεν υπάρχει κίνδυνος στις πόλεις Francistown και Gaborone. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι πολύ χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 90%, <i>P. vivax</i> 5%, <i>P. ovale</i> 5%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Μπουρκίνα Φάσο</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 80%, <i>P. ovale</i> 5%–10%, <i>P. vivax</i> σπάνια.	Δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, ατοβακόνη/προγουανίλη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Μπουρουντί</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 86%, <i>P. malariae</i> 12%, το υπόλοιπο <i>P. ovale</i> και <i>P. vivax</i> .	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Μπουτάν</b>	Σε αγροτικές περιοχές σε υψόμετρο <1.700 μ (5,577 ft) στις επαρχίες της νότιας ζώνης, κατά μήκος των συνόρων με την Ινδία, Chirang, Geylegphug, Samchi, Samdrup Jongkhar και Shemgang. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι πολύ χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 60%, <i>P. vivax</i> 40%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Μπρούνεϊ</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Ναμίμπια</b>	Στις επαρχίες Kunene, Ohangwena, Okavango, Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjura και Caprivi Strip. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 90%, <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i> και <i>P. vivax</i> 10% σε συνδυασμό.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Νέα Ζηλανδία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νέα Καληδονία (Γαλλία)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νεπάλ</b>	Σε όλη τη χώρα σε υψόμετρο < 1.200μ (3,937 ft). Δεν υπάρχει κίνδυνος στο Κατμαντού και στα μονοπάτια στα Ιμαλάια. Δεν υπάρχουν δεδομένα για το σχετικό κίνδυνο για τον ταξιδιώτη. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 88%, <i>P. falciparum</i> 12%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Νησιά Antigua &amp; Barbuda</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Barbados</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Cape Verde (Πράσινο Ακρωτήριο)</b>	Λίγα κρούσματα στο νησί Saõ Tiago. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι πολύ χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: κυρίως <i>P. falciparum</i> .	Συνιστώνται τα γενικά προληπτικά μέτρα για την προστασία από τα κουνούπια. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Νησιά Cayman (Ηνωμένο Βασίλειο)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Christmas (Αυστραλία)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Cocos (Keeling) (Αυστραλία)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Comoros</b>	Σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχουν δεδομένα για το σχετικό κίνδυνο για ταξιδιώτες. Είδος πλασμοδίου: κυρίως <i>P. falciparum</i> .	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.



**Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα**

<b>Χώρα</b>	<b>Κίνδυνος</b>	<b>Προφυλακτική αγωγή*</b>
<b>Νησιά Cook (Νέα Ζηλανδία)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Falkland (Islas Malvinas)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Faroe (Δανία)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Fiji (Φιτζι)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Guam (Η.Π.Α)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Kiribati (πρώην Gilbert) και Tarawa, Tabuaeran (Fanning), Banaba (Ocean)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Madeira (Πορτογαλία)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Marshall</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Nauru</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Niue (Νέα Ζηλανδία)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Norfolk (Αυστραλία)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Palau</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Pitcairn (Ηνωμένο Βασίλειο)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Νησιά Sao Tomé και Príncipe</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι πολύ χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i> 15% σε συνδυασμό, <i>P. vivax</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Νησιά St. Kitts (Saint Christopher), Nevis (Ηνωμένο Βασίλειο)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά St. Pierre και Miquelon (Γαλλία)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά St. Vincent και Grenadines</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Tokelau (Νέα Ζηλανδία)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Tonga</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Trinidad και Tobago</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Turks και Caicos (Ηνωμένο Βασίλειο)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Tuvalu</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Vanuatu</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 60%, <i>P. vivax</i> 35%–40%, <i>P. ovale</i> <1%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Νησιά Virgin (Μ. Βρετανία)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Virgin (Η.Π.Α.)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Νησιά Wake</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Αζόρες (Πορτογαλία)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Βερμούδα (Μ.Βρετανία)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Βόρειοι Μαριάνα (και τα νησιά Saipan, Tinian, Rota) (Η.Π.Α)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Βρετανικού Εδάφους του Ινδικού Ωκεανού (και το Diego Garcia) (Ηνωμένο Βασίλειο)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Κανάρια (Ισπανία)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Νότια Γεωργία και Νότια Sandwich</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νησιά Παπούα Νέα Γουϊνέα</b>	Σε όλη τη χώρα σε υψόμετρο <math>< 1.800 \mu (5,906 \text{ ft})</math>. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 65%-80%, <i>P. vivax</i> 10%-30%, <i>P. malariae</i> και <i>P. ovale</i> το υπόλοιπο.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη ( <i>P. falciparum</i> και <i>P. Vivax</i> ).
<b>Νησιά Σολωμόντα</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο κίνδυνος για τους ταξιδιώτες είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 60%, <i>P. vivax</i> 35%-40%, <i>P. ovale</i> <math>< 1\%</math>.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Νήσος Anguilla (Ηνωμένο Βασίλειο)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Νήσος Aruba</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νήσος Martinique (Γαλλία)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νήσος Mayotte (Γαλλία)</b>	Σε όλη τη χώρα. Είδος πλασμωδίου: <i>P. falciparum</i> 40%-50%, <i>P. vivax</i> 35%-40%, <i>P. ovale</i> <1%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Νήσος Montserrat (Ηνωμένο Βασίλειο)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νήσος Réunion (Γαλλία)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νήσος Saint Helena (Ηνωμένο Βασίλειο)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νήσος Saint Lucia</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νήσος Samoa (πρώην Δυτική Somoa)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νήσος Samoa (Η.Π.Α)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νήσος Αϊτή</b>	Σε όλη τη χώρα και στο Port Labadee. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμωδίου: <i>P. falciparum</i> 100%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, χλωροκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.
<b>Νήσος Γουαδελούπη, St. Barthelemy και Saint Martin (Γαλλία)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νήσος Πάσχα (Χιλή)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Νιγηρας</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. ovale</i> 5%–10%, <i>P. vivax</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Νιγηρία</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. ovale</i> 5%–10%, <i>P. vivax</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Νικαράγουα</b>	Στις περιοχές Chinandega, Leon, Managua, Matagalpa, Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) και Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS). Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 95%, <i>P. falciparum</i> 5%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, χλωροκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.
<b>Νορβηγία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Νότια Αφρική</b>	Στο βορειοανατολικό τμήμα της επαρχίας KwaZulu-Natal έως τον ποταμό Tugela στα νότια, στην επαρχία Limpopo στα βόρεια και στην επαρχία Mpumalanga. Επίσης στο Εθνικό Πάρκο Kruger. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 90%, <i>P. vivax</i> 5%, <i>P. ovale</i> 5%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Νότια Κορέα</b>	Περιορισμένος κίνδυνος από Μάρτιο-Δεκέμβριο σε αγροτικές περιοχές στο βόρειο τμήμα των επαρχιών Incheon, Kangwon-do και Kyonggi-do και στην αποστρατικοποιημένη ζώνη (DMZ). Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 100%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, χλωροκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.
<b>Νότιο Σουδάν</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 90%, <i>P. malariae</i> , <i>P. vivax</i> και <i>P. ovale</i> 10% σε συνδυασμό.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Ολλανδία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ολλανδικές Αντίλλες (Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustasius, St. Maarten)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ομάν</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ονδούρα</b>	Σε όλη τη χώρα σε υψόμετρο < 1.000 μ (3,281 ft) και στο Roatán και τα άλλα Νησιά Bay. Δεν υπάρχει κίνδυνος στα San Pedro Sula και Tegucigalpa. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 93%, <i>P. falciparum</i> 7%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, χλωροκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.
<b>Ουγγαρία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ουγκάντα</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> >85%, το υπόλοιπο <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i> και <i>P. vivax</i> .	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Ουζμπεκιστάν</b>	Έχουν αναφερθεί στο παρελθόν. Σπάνια αναφέρονται κρούσματα στα σύνορα με το Αφγανιστάν και το Τατζικιστάν. Δεν αναφέρθηκαν κρούσματα το 2009. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι πολύ χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 100%.	Συνιστώνται τα γενικά προληπτικά μέτρα για την προστασία από τα κουνούπια. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.
<b>Ουκρανία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ουρουγουάη</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Πακιστάν</b>	Σε όλη τη χώρα (συμπεριλαμβανομένων όλων των πόλεων) σε υψόμετρο <2.500 μ (<8,202 ft). Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 70%, <i>P. vivax</i> 30%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Παναμάς</b>	Κυρίως στις επαρχίες ανατολικά από τη Διώρυγα του Παναμά στα σύνορα με την Κολομβία (επαρχίες του Παναμά ανατολικά της διώρυγας και Darién). Ακόμη στις επαρχίες C. Ngöbe-Buglé, Chiriquí, Coclé, Kuna Yala (San Blas) και Veraguas. Δεν υπάρχει κίνδυνος στην πόλη του Panama ή στην πρώην Ζώνη της Διώρυγας. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 99%, <i>P. falciparum</i> 1%.	Στις επαρχίες ανατολικά από τη Διώρυγα του Παναμά: ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη,. Στις άλλες ενδημικές περιοχές συνιστώνται τα γενικά προληπτικά μέτρα για την προστασία από τα κουνούπια. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη (ανατολικά από τη Διώρυγα του Παναμά)
<b>Παραγουάη</b>	Στις περιοχές Alto Paraná, Caaguazú και Canendiyú. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι πολύ χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 95%, <i>P. falciparum</i> 5%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, χλωροκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.
<b>Περού</b>	Σε όλη τη χώρα σε υψόμετρο <2.000 μ (6,561 ft) και στις πόλεις Iquitos και Puerto Maldonado. Δεν υπάρχει κίνδυνος στις πόλεις Ica, Lima (και στις ακτές νότια της Lima), Nazca, στις τουριστικές περιοχές (Cuzco, Machu Picchu, Λίμνη Titicaca) και στις νότιες πόλεις Arequipa, Moquegua, Puno και Tacna. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 70%, <i>P. falciparum</i> 30%, <i>P. malariae</i> <1%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Πολωνία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Πορτογαλία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Πουέρτο Ρίκο (Η.Π.Α.)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM)</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ρουάντα</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμωδίου: <i>P. falciparum</i> >85%, <i>P. vivax</i> 5%, <i>P. ovale</i> 5%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Ρουμανία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ρωσία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Σαν Μαρίνο</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Σαουδική Αραβία</b>	Στις επαρχίες στα σύνορα με την Υεμένη, ειδικά στις Asir και Jizan. Επίσης και στο εμιράτο Al Bahah. Δεν υπάρχει κίνδυνος στις πόλεις Jiddah, Mecca, Medina, Riyadh και Ta'if. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμωδίου: κυρίως <i>P. falciparum</i> , το υπόλοιπο <i>P. vivax</i> .	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Σενεγάλη</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμωδίου: <i>P. falciparum</i> >85%, <i>P. ovale</i> 5%-10%, <i>P. vivax</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Σερβία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Σεϋχέλλες</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται



## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Σιγκαπούρη</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Σιέρα Λεόνε</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i> και <i>P. vivax</i> 15% σε συνδυασμό.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Σλοβακία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Σλοβενία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Σομαλία</b>	Σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχουν δεδομένα για το σχετικό κίνδυνο για τον ταξιδιώτη. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 95%, <i>P. vivax</i> , <i>P. malariae</i> και <i>P. ovale</i> 5% σε συνδυασμό.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Σουαζιλάνδη</b>	Στις ανατολικές περιοχές στα σύνορα με τη Μοζαμβίκη και τη Νότια Αφρική και στις περιοχές Lubombo και στο ήμισυ του ανατολικού τμήματος των περιοχών Hhohho και Shiselweni. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι πολύ χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 90%, <i>P. vivax</i> 5%, <i>P. ovale</i> 5%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Σουδάν</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 90%, <i>P. malariae</i> , <i>P. vivax</i> και <i>P. ovale</i> 10% σε συνδυασμό.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Σουηδία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Σουρινάμ</b>	Στις επαρχίες Brokopondo και Sipaliwini. Δεν υπάρχει κίνδυνος στο Paramaribo. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 70%, <i>P. vivax</i> 15%–20%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Σρι Λάνκα</b>	Σε όλη τη χώρα εκτός από τις επαρχίες Colombo, Galle, Gampaha, Kalutara, Matara και Nuwara Eliya. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι πολύ χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 88%, <i>P. falciparum</i> 12%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Συρία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Ταϊβάν</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Τανζανία</b>	Σε όλη τη χώρα σε υψόμετρο < 1.800μ (5,906 ft). Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> >85%, <i>P. malariae</i> και <i>P. ovale</i> >10% σε συνδυασμό, <i>P. vivax</i> σπάνια.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Τατζικιστάν</b>	Σε όλες τις περιοχές σε υψόμετρο < 2.000μ (6,561 ft). Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι πολύ χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> 90%, <i>P. falciparum</i> 10%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Ταϊλάνδη</b>	Σε αγροτικές, δασώδεις περιοχές στα σύνορα με Καμπότζη, Λάος και Βιρμανία (Μπούρμα) και σε αγροτικές, δασώδεις περιοχές των Phang Nga και Phuket. Δεν υπάρχει κίνδυνος στις πόλεις Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Koh Samui, Koh Phangan, Phang Nga Pattaya, και Phuket. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 50% (έως 75% σε κάποιες περιοχές), <i>P. vivax</i> 50% (έως 60% σε κάποιες περιοχές), το υπόλοιπο <i>P. ovale</i> .	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη, μεφλοκίνη.
<b>Τζαμάϊκα</b>	Σπάνια αναφέρονται κρούσματα στο Kingston. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι πολύ χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 100%.	Συνιστώνται μόνο τα γενικά προληπτικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.
<b>Τζιμπουτί</b>	Σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχουν δεδομένα για το σχετικό κίνδυνο για το ταξιδιώτη. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 90%, <i>P. vivax</i> 5%-10%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
<b>Τόγκο</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. ovale</i> 5%-10%, το υπόλοιπο <i>P. vivax</i> .	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Τουρκία</b>	Στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Δεν υπάρχει κίνδυνος στη βάση Incerlik US της πολεμικής αεροπορίας και σε δημοφιλείς κρουαζιέρες. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι πολύ χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. vivax</i> κυρίως, <i>P. falciparum</i> σποραδικά.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη, χλωροκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: όχι.
<b>Τουρκμενιστάν</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Τσαντ</b>	Σε όλη τη χώρα. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι υψηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 85%, <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i> και <i>P. vivax</i> 15% σε συνδυασμό.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Τσεχία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Τυνησία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται
<b>Υεμένη</b>	Σε όλες τις περιοχές σε υψόμετρο < 2.000μ (6,561ft). Δεν υπάρχει κίνδυνος στη Sana'a. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι μέτριος. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 95%, <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i> και <i>P. vivax</i> 5% σε συνδυασμό.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Φιλιππίνες</b>	Σε αγροτικές περιοχές σε υψόμετρο < 600μ (1,969 ft), στα νησιά Luzon, Mindanao, Mindoro και Palawan. Δεν υπάρχει κίνδυνος σε αστικές περιοχές. Ο σχετικός κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι χαμηλός. Είδος πλασμοδίου: <i>P. falciparum</i> 70%-80%, <i>P. vivax</i> 20%-30%.	Ατοβακόνη/προγουανίλη, δοξουκυκλίνη, μεφλοκίνη. Αντοχή σε ανθελονοσιακά: χλωροκίνη.
<b>Φινλανδία</b>	Κανένας	Δεν συνιστάται

## Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα

Χώρα	Κίνδυνος	Προφυλακτική αγωγή*
Χιλή	Κανένας	Δεν συνιστάται
Χόγκκ-Κονγκ (Κίνα)	Κανένας	Δεν συνιστάται

\*Συστήνεται ένα από τα φάρμακα

Πηγή: Center for Disease Control and Prevention(CDC). Malaria Information by country. Στο: <http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/yellow-fever-and-malaria-information-by-country.htm>