

Ανθελονοσιακή Χημειοπροφύλαξη για ταξιδιώτες σε ενδημικές περιοχές

| Φάρμακο | Σκεύασμα | Δόση Ενηλίκων | Αντενδείξεις | Ανεπιθύμητες Ενέργειες |
|---|--|--|--|---|
| Χλωροκίνη (Chloroquine) | Tab 200 mg χλωροκίνης Sir 25 mg/5 ml | 300 mg/εβδ ή 100 mg/ημ (έναρξη 1 εβδομάδα πριν το ταξίδι, για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και για 4 βδομάδες μετά την επιστροφή) | Αλλεργία στη χλωροκίνη, άτομα με έλλειψη G6PD, ψωρίαση, αμφιβληστροειδοπάθεια, νόσο του Κ.Ν.Σ., μυασθένεια gravis, διαταραχές του αιμοποιητικού συστήματος, και σε άτομα με ιστορικό επιληψίας ή ψύχωσης. | Κνησμός, ναυτία, κεφαλαλγία, διαταραχές όρασης, υπέρχρωση δέρματος-ονύχων, εξάνθημα, μυοπάθεια, φωτοφοβία, κώφωση, αλωπεκία, αμφιβληστροειδοπάθεια σε μακρόχρονη λήψη, δυσκρασίες αίματος, ψύχωση, σπασμοί. |
| Μεφλοκίνη (Mefloquine) | Lariam, Tab 250mg | 250 mg/εβδ (έναρξη 2 - 3 βδομάδες πριν το ταξίδι, για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και για 4 βδομάδες μετά την επιστροφή). | Αλλεργία στη μεφλοκίνη, ψυχιατρικές ή νευρολογικές διαταραχές, ιστορικό επιληψίας, ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, έγκυες ή θηλάζουσες, παιδιά βάρους < 15 kg. <u>Προσοχή στη χορήγηση</u> : Αρρυθμίες, επαγγέλματα που απαιτούν λεπτούς χειρισμούς ή στερεοσκοπική όραση (π.χ. πιλότοι) | ζάλη, ναυτία, διάρροια, κεφαλαλγία, διαταραχές του ύπνου, αλλαγή συμπεριφοράς, σπασμοί, ψυχιατρικές διαταραχές |
| Δοξυκυκλίνη (Doxycycline) | Novimax, Impalamycin, Otosal, Microvibrate, Relyomycin, Smilitene, caps 100mg Vibramycin, Disp.Tab 100mg, sir 50mg/5 ml | 100 mg/ημ (έναρξη 1 ημέρα πριν το ταξίδι, για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και για 4 βδομάδες μετά την επιστροφή). | Αλλεργία στις τετρακυκλίνες, παιδιά < 8 ετών, κύηση <u>Προσοχή στη χορήγηση</u> : σε άτομα με φωτοευαισθησία, άσθμα, μυκητίαση του κόλπου | γαστρεντερικές διαταραχές, φωτοευαισθησία, μυκητιασική κολπίτιδα, αλλεργικές αντιδράσεις, δυσκρασίες αίματος, ηπατίτιδα. |
| Συνδυασμός Ατοβακόνης Προγουανίλης (Atovaquone - Proguanil) | Malarone, tb 250mg ατοβακόνη +100mg προγουανίλη Malarone Paediatric, tab (62,5 mg ατοβακόνη + 25 mg προγουανίλη) | 1 tab/ημ. (έναρξη 1 ημέρα πριν το ταξίδι, για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και για 7 ημέρες μετά την επιστροφή) | Αλλεργία στα συστατικά του. Σημαντικού βαθμού νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης<30ml/min). Λόγω έλλειψης δεδομένων ασφαλείας, η χρήση του αποφεύγεται σε κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και του θηλασμού και σε παιδιά<11 kg. | Γαστρεντερικές διαταραχές, αφθώδης στοματίτιδα, σπασμοί, εξανθήματα, αύξηση των τρανσαμινασών. |
| Πριμακίνη (Primaquine) | Tab 15 mg | Τελική προφύλαξη : 15 mg/ημ (30 mg/ημ για <i>P.vivax</i> ανθεκτικό στην πριμακίνη) | άτομα με έλλειψη G6PD, κύηση, παιδιά < 5 ετών | Γαστρεντερικές δια/χές, αιμόλυση επί ελλείψεως G6PD, μεθαιμοσφαιριναιμία |
| Προγουανίλη (Proguanil) | Tab 100 mg | 200 mg/ημ Δεν πρέπει να χορηγείται μόνη της για χημειοπροφύλαξη | Δεν έχει καμία απόλυτη αντένδειξη | Ανορεξία, ναυτία, αφθώδης στοματίτιδα |