



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιδημιολογική Επιτήρηση HIV/AIDS

Προκαταρκτικά δεδομένα 2023

(Έως και 31/10/2023)



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ HIV/AIDS
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ HIV/AIDS, ΣΜΝ & ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ)



Ελληνική Δημοκρατία / Υπουργείο Υγείας




Εισαγωγή

Η επιδημιολογική επιτήρηση της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα πραγματοποιείται κυρίως μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης των περιστατικών HIV λοίμωξης, των κρουσμάτων AIDS και των θανάτων. Η παρακολούθηση της πορείας της επιδημίας αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS της Διεύθυνσης Πρόληψης & Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS, ΣΜΝ & Ηπατιτίδων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Συνολικές διαγνώσεις HIV/AIDS και θάνατοι

Σύμφωνα με το σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης, μέχρι και την 31^η Οκτωβρίου του 2023, έχουν καταγραφεί στο Αρχείο HIV του ΕΟΔΥ (έως και τις 04/04/2023) και στο Εθνικό Μητρώο HIV του Υπουργείου Υγείας (από τις 05/04/2023) 20.493 περιστατικά HIV λοίμωξης (82,1% άνδρες). Από το σύνολο των ατόμων αυτών, 4.647 έχουν εμφανίσει AIDS και 3.416 έχουν αποβιώσει (Εικόνα 1).


Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης HIV



Εικόνα 1. Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης HIV, συνολικά δεδομένα έως 31/10/2023.

Νέες διαγνώσεις HIV – Τρόποι μετάδοσης – Διαχρονικά δεδομένα

Την περίοδο 01/01/2023 – 31/10/2023 διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν στον ΕΟΔΥ και στο Εθνικό Μητρώο HIV του Υπουργείου Υγείας 531 περιστατικά HIV λοίμωξης (5,1 ανά 100.000 πληθυσμού), εκ των οποίων τα 416 (78,3%) αφορούσαν σε άνδρες και τα 115 (21,7%) σε γυναίκες. Οι νέες διαγνώσεις HIV ανά 100.000 πληθυσμού για την περίοδο αυτή, φαίνεται να κυμαίνονται σε λίγο υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με εκείνες που δηλώθηκαν τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα των 4 προηγούμενων ετών (Σχήμα 1).




Σχήμα 1. Νέες διαγνώσεις HIV λοίμωξης ανά 100.000 πληθυσμού (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2010-2023).

Τους πρώτους δέκα μήνες του 2023, τα περισσότερα περιστατικά που διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν στον ΕΟΔΥ και το Εθνικό Μητρώο HIV αφορούσαν σε άτομα που μολύνθηκαν μέσω της απροφύλακτης σεξουαλικής επαφής, κυρίως μεταξύ ανδρών. Ειδικότερα, οι 187 (35,2%) νέες διαγνώσεις HIV αφορούσαν σε άνδρες που είχαν απροφύλακτες σεξουαλικές επαφές με άνδρες (ΑΣΑ), ενώ οι 84 (15,8%) αφορούσαν σε άτομα που μολύνθηκαν μέσω της απροφύλακτης ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής (ΕΤΕΡΟ). Η από κοινού χρήση ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών δηλώθηκε ως πιθανός τρόπος μόλυνσης για 62 (11,7%) νέα περιστατικά, ενώ ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο αριθμός των περιστατικών με ακαθόριστο ή μη συμπληρωμένο τρόπο μόλυνσης (198 - 37,3%) (Εικόνα 2).

Τρόπος μετάδοσης	Σύνολο	Άρρεν	Θήλυ
Σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών	187 (35,2%)	187	-
Ετεροφυλοφιλική σεξουαλική επαφή	84 (15,8%)	36	48
Χρήση ενδοφλέβιων εξαρτησ. ουσιών	62 (11,7%)	48	14
Ακαθόριστος ή μη συμπληρωμένος	198 (37,3%)	145	53
Σύνολο	531	416	115


Εικόνα 2. Νέες διαγνώσεις HIV ανά τρόπο μετάδοσης και φύλο (01/01 – 31/10/2023).

Από την έναρξη της παρακολούθησης της επιδημίας, οι νέες διαγνώσεις HIV αφορούν στην πλειοψηφία τους σε άτομα που μολύνθηκαν μέσω σεξουαλικής επαφής μεταξύ ανδρών και ακολουθεί, η ετεροφυλοφιλική σεξουαλική επαφή (Σχήμα 2). Εξάιρεση αποτελεί η χρονική περίοδος 2011 – 2013, κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκε σημαντική αύξηση στα περιστατικά που μολύνθηκαν μέσω της ενδοφλέβιας χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Ειδικότερα, το 2012, η χρήση ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών ήταν πρώτη σε συχνότητα (n=486), ξεπερνώντας τη σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών (n=310). Μετά το 2013 σημειώνεται σταδιακή μείωση των νέων περιστατικών HIV που μολύνθηκαν μέσω της ενδοφλέβιας χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, χωρίς ωστόσο να έχουν προσεγγιστεί τα προ της επιδημίας του HIV στον συγκεκριμένο πληθυσμό, επίπεδα (Σχήμα 2). Το 2023, είναι αξιοσημείωτη η αύξηση που παρατηρείται στα περιστατικά HIV για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί ο τρόπος μετάδοσης. Για πρώτη φορά, οι διαγνώσεις HIV με ακαθόριστο τρόπο μόλυνσης (n=198) ξεπερνούν σε συχνότητα εκείνες που μολύνθηκαν μέσω σεξουαλικής επαφής μεταξύ ανδρών (n=187) (Σχήμα 2).



Σχήμα 2. Νέες διαγνώσεις HIV ανά κατηγορία μετάδοσης (Ιαν-Οκτ 2010-2023).

Διαχρονικά, το ποσοστό των νέων περιστατικών με ακαθόριστο τρόπο μόλυνσης δεν ξεπερνούσε το 20%. Ωστόσο, το 2023 έφτασε το 37,3%, κάτι που δυσχεραίνει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με την κατανομή του τρόπου μόλυνσης στις νέες διαγνώσεις (Σχήμα 3).



Σχήμα 3. Ποσοστό νέων διαγνώσεων με ακαθόριστο τρόπο μόλυνσης (Ιαν-Οκτ 2011-2022).

Σύνοψη

- Οι νέες διαγνώσεις HIV κυμαίνονται σε λίγο υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τα 4 προηγούμενα έτη (531 που αντιστοιχούν σε 5,1 ανά 100.000 πληθυσμού).
- Συχνότερος τρόπος μόλυνσης είναι η σεξουαλική επαφή, κυρίως μεταξύ ανδρών (35,2% των νέων διαγνώσεων).
- Παρατηρείται αύξηση στις νέες διαγνώσεις με ακαθόριστο τρόπο μόλυνσης (37,3% των νέων διαγνώσεων), οι οποίες ξεπερνούν σε συχνότητα εκείνες που μολύνθηκαν μέσω σεξουαλικής επαφής μεταξύ ανδρών.

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων - Στατιστικής και Διαχείρισης Δεδομένων του ΕΟΔΥ