



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


**Δεδομένα σχετικά με τις ενάρξεις αντιρετροϊκής
θεραπείας στην Ελλάδα, σε περιστατικά HIV λοίμωξης
που μολύνθηκαν μέσω της χρήσης ενδοφλέβιων
εξαρτησιογόνων ουσιών και διαγνώστηκαν έως τις
31/12/2021**

(Καταγραφή έως 21/06/2022)


Διεύθυνση Πρόληψης & Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS,
ΣΜΝ & Ηπατιτίδων

ΑΘΗΝΑ 2022

Ετήσιες ενάρξεις αντιρετροϊκής αγωγής σε ΧΕΝ: Το 2021 οι ενάρξεις αντιρετροϊκής θεραπείας σε ΧΕΝ ανήλθαν σε 83 (64 άνδρες, 19 γυναίκες).



Ετήσιες διαγνώσεις ΧΕΝ, στις οποίες έχει πραγματοποιηθεί έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής: Τα ποσοστά των ετήσιων διαγνωσθέντων περιστατικών HIV θετικών ΧΕΝ από το 2010 έως το 2021, τα οποία είχαν ξεκινήσει αντιρετροϊκή θεραπεία έως τις 21/06/2022, κυμαίνονται από 70,8% (διαγνώσεις 2012) έως 95,3% (διαγνώσεις 2017). Ειδικότερα, οι ΧΕΝ που διαγνώστηκαν με HIV το 2019, 2020 και 2021, έχουν ξεκινήσει αντιρετροϊκή αγωγή έως τις 21/06/2022, σε ποσοστό 88%, 85% και 73,6%, αντίστοιχα.



Μέσος χρόνος έναρξης αντιρετροϊκής αγωγής σε ΧΕΝ: Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη διάγνωση της HIV λοίμωξης μέχρι την έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής σε ΧΕΝ έχει ελαττωθεί κατά την τελευταία δεκαετία. Ο μέσος χρόνος έναρξης αντιρετροϊκής αγωγής σε HIV (+) ΧΕΝ που διαγνώστηκαν τα έτη 2019, 2020, 2021 ανέρχεται σε 128, 102 και 67 ημέρες, αντίστοιχα.

