



Εμβόλια ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού

Η αντιμετώπιση του ταξιδιώτη πριν το ταξίδι χρειάζεται να εξατομικεύεται και να γίνεται κατόπιν της εκτίμησης του κινδύνου και της κλινικής αξιολόγησης από τον επαγγελματία υγείας. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με ένα ταξίδι εξαρτώνται από παράγοντες όπως ο προορισμός, οι συνθήκες και η διάρκεια της διαμονής, η εποχή, ο σκοπός της επίσκεψης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ταξιδιώτη (ηλικία, φύλο, κατάσταση υγείας, συμπεριφορά).

Καλό θα ήταν η επίσκεψη στον επαγγελματία υγείας ή σε ένα ιατρείο ταξιδιωτικής ιατρικής ή στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας να προγραμματίζεται τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Αυτή η επίσκεψη είναι απαραίτητη, έστω και την τελευταία στιγμή.

Η επιλογή των εμβολίων εξαρτάται από την επιδημιολογία των νοσημάτων σε κάθε προορισμό, τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού (π.χ. συνθήκες, σκοπός, διάρκεια), τις δραστηριότητες του ταξιδιώτη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως η ηλικία, το ιστορικό υγείας και εμβολιασμού και η συμπεριφορά του.

Επίσης, ένα ταξίδι αποτελεί μία καλή ευκαιρία να γίνουν αναμνηστικές δόσεις των εμβολίων του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού (τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης), που γίνονται ακόμα πιο απαραίτητα πριν από ένα ταξίδι στο εξωτερικό.

Τα μόνα εμβόλια που απαιτούνται για να επιτραπεί η είσοδος σε ορισμένες χώρες είναι το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού και το εμβόλιο του μηνιγγιτιδοκόκκου.

Κάθε ταξιδιώτης χρειάζεται να γνωρίζει ότι ο εμβολιασμός δεν προσφέρει πλήρη προστασία και να λαμβάνει τα γενικά προληπτικά μέτρα π.χ. για τα δήγματα από έντομα και ζώα, για τα νοσήματα που μεταδίδονται από τρόφιμα και νερό, για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα κ.α.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Αγία Ελένη, Ηνωμένο Βασίλειο (Saint Helena, U.K.)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Άγιος Βαρθολομαίος (Saint Barthelemy)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες (Saint Vincent & Grenadines)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Άγιος Ευστάθιος (Sint Eustatius)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 6 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Αγία Λουκία (Saint Lucia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Άγιος Μαρτίνος (Saint Martin)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Άγιος Μαρτίνος (Sint Maarten)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Άγιος Πέτρος και Μικελόν, Γαλλία (Saint Pierre & Miquelon, France)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Ηνωμένο Βασίλειο (Saint Kitts & Nevis, U.K.)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Αζόρες, Πορτογαλία (Azores)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Αίγυπτος (Egypt)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Συμπεριλαμβάνονται οι χώρες Ερυθραία, Ρουάντα, Σομαλία, Τανζανία και Ζάμπια. Αν ο ταξιδιώτης δεν φέρει πιστοποιητικό εμβολιασμού, θα παραμείνει σε απομόνωση έως και 6 ημέρες από την αναχώρηση από την περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Αιθιοπία (Ethiopia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας, λύσσας, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών. Συνήθως δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που η διαμονή τους περιορίζεται στην περιοχή Αφάρ (Afar) και στις Σομαλικές Επαρχίες (Somali Provinces).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Αϊτή (Haiti)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, χολέρας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ακτή Ελεφαντοστού (Côte d'Ivoire/Ivory Coast)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, μηνιγγίτιδας, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών.
Αλβανία (Albania)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εγκεφαλίτιδας από κρότωνα	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Αλγερία (Algeria)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, χολέρας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Αμερικανική Σαμόα (American Samoa/US)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Ανατολικό Τιμόρ (Timor-Leste/East Timor)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ανγκίλα (Anguilla) (Ηνωμένο Βασίλειο)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Ανγκόλα (Angola)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.
Ανδόρα (Andorra)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Ανταρκτική (Antarctica)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης	Όχι	Όχι
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα (Antigua & Barbuda)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Αργεντινή (Argentina)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που θα επισκεφθούν τις επαρχίες Κορριέντες (Corrientes) και Μισιόνες (Misiones). Συνήθως δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που θα επισκεφθούν την επαρχία Φορμόζα (Formosa) και συγκεκριμένες περιοχές των επαρχιών Τσάκο (Chaco), Χουχούι (Jujuy) και Σάλτα (Salta). Δεν	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
		συνιστάται στους ταξιδιώτες που θα επισκεφθούν περιοχές και επαρχίες που δεν αναφέρονται παραπάνω.	
Αρμενία (Armenia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Αρούμπα (Aruba)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Αυστραλία (Australia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος στο Εκουαδόρ.
Αυστρία (Austria)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Β, εγκεφαλίτιδας από κρότωνες	Όχι	Όχι
Αφγανιστάν (Afghanistan)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, χολέρας	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Βανουάτου (Vanuatu)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Βέλγιο (Belgium)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Βενεζουέλα (Venezuela)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών. Συνήθως δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που το ταξίδι τους περιορίζεται στις περιοχές: Αράγκουα (Aragua), Καραμπόμπο (Carabobo), Μιράντα (Miranda), Βάργκας (Vargas), Γιαράκουι (Yaracuy) Ντιστρίτο Καπιτάλ (Distrito Capital). Δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που θα επισκεφθούν μόνο τις ακόλουθες περιοχές : όλες οι περιοχές σε υψόμετρο $>2.300\mu$ στις πολιτείες Μέριδα (Merida), Ταχίρα (Tachira), Τρουχίγιο (Trujillo), τις πολιτείες Φαλκόν (Falcon) και Λάρα (Lara), το νησί Margarita, τις πόλεις Καράκας (Caracas) και Βαλένθια (Valencia).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι στη Βραζιλία και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες σε αεροδρόμιο της Βραζιλίας.
Βερμούδες (Bermuda, UK)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Βιετνάμ (Vietnam)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Όχι
Βιρμανία/Μπούρμα (Burma/Myanmar)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, χολέρας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Βολιβία (Bolivia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών που ταξιδεύουν ανατολικά της οροσειράς των Άνδεων σε υψόμετρο <2300μ: στις επαρχίες Μπένι (Beni), Πάντο (Pando), Σάντα Κρουζ (Santa Cruz), και ορισμένες περιοχές των Τσουκισάκα (Chuquisaca), Κοτσάμπάμπα (Cochabamba), Λα Παζ (La Paz) και Ταρίχα (Tarija). Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που η παραμονή τους περιορίζεται σε υψόμετρο >2300μ, σε όλες τις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω και στις πόλεις Λα Παζ (La Paz) και Σούκρε (Sucre).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Βόρεια Κορέα (North Korea)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Βόρεια Μαριάνα Νησιά (Northern Mariana) και νησιά Σαϊπαν (Saipan), Τίνιαν (Tinian) και Ρότα (Rota) (ΗΠΑ)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Bosnia-Herzegovina)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Βουλγαρία (Bulgaria)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, εγκεφαλίτιδας από κρότzwνες	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Βραζιλία (Brazil)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	<p>Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται τις περιοχές: Άκρε (Acre), Αμαπά (Amapá), Αμαζόνας (Amazonas), Ομοσπονδιακό Διαμέρισμα (Distrito Federal) και η πρωτεύουσα Μπραζίλια (Brasília), Εσπίριτο Σάντο (Espírito Santo), Γκοϊάς (Goiás), Μαρανιάο (Maranhão), Μάτο Γκρόσσο (Mato Grosso), Μάτο Γκρόσσο ντο Σουλ (Mato Grosso do Sul), Μίνας Ζεράις (Minas Gerais), Παρά (Pará), Παρανά (Paraná), Ρίο ντε Τζανέιρο (και η πόλη του Rio de Janeiro και όλα τα παράκτια νησιά), Ρίο Γκράντε ντο Σουλ (Rio Grande do Sul), Ροντόνια (Rondônia), Ροράιμα (Roraima), Σάντα Καταρίνα (Santa Catarina), Σάο Πάολο (και η πόλη São Paulo και όλα τα παράκτια νησιά), Τοκαντίνς (Tocantins), και συγκεκριμένες περιοχές των πολιτειών: Μπαΐα (Bahia), Πιαουί (Piauí).</p> <p>Συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τους καταρράκτες Ιγκουασσού (Iguassu Falls).</p>	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
		Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που το ταξίδι τους περιορίζεται σε περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω και στις πόλεις Φορταλέζα (Fortaleza) και Ρεσίφε (Recife).	
Βρετανικά Νησιά Ινδικού Ωκεανού και Ντιέγκο Γκαρσία (British Indian Ocean Territory, Diego Garcia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Γαλλία (France)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Γαλλική Γουιάνα (French Guiana)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους.
Γαλλική Πολυνησία (French Polynesia), και τα νησιά: Σοσιετέ-Ταΐτη, Μοορέα, Μπόρα Μπόρα (Society-Tahiti, Moorea, Bora-Bora), Μαρκέζας- Χίβα Όα,	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ούα Χούκα (Marquesas- Hiva Oa, Ua Huka), Αουστράλ-Τουμπούαϊ, Ρουρούτου (Austral-Tubuai, Rurutu)			
Γερμανία (Germany)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Γεωργία (Georgia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Γιβραλτάρ (Gibraltar/UK)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Γκάμπια (Gambia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Γκαμπόν (Gabon)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους.
Γκάνα (Ghana)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, μηνιγγίτιδας, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.
Γκουάμ, ΗΠΑ (Guam, USA)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Γουαδελούπη (Guadeloupe)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Γουατεμάλα (Guatemala)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Γουέικ Νησί (Wake Island, US)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Γουϊάνα (Guyana)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 4 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Εξαιρείται η Αργεντινή, η Παραγουάη, το Τρινιντάντ και το Τομπάγκο.
Γουϊνέα (Guinea)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Γουϊνέα-Μπισό (Guinea-Bissau)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους.
Γρενάδα (Grenada)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Γροιλανδία, Δανία (Greenland)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Δανία (Denmark)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής (Central African Republic)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, μηνιγγίτιδας, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών.
Δημοκρατία του Κονγκό (Republic of the Congo-Brazzaville)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Δομινικανική Δημοκρατία (Dominican Republic)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, χολέρας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι στις πολιτείες Εσπίριτο Σάντο (Espirito Santo), Μίνας Ζεράις (Minas Gerais), Ρίο ντε Τζανέιρο (Rio de Janeiro) ή Σάο Πάολο (São Paulo) της Βραζιλίας, και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο κάποιας από τις παραπάνω περιοχές της Βραζιλίας.
Δομινίκα (Dominica)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Δυτική Σαχάρα (Western Sahara)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Δεν έχει δηλώσει τις απαιτήσεις της για το πιστοποιητικό εμβολιασμού κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Εκουαδór/νησιά Γκαλαπάγκος (Ecuador, Galápagos Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσης	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών που θα επισκεφθούν τις παρακάτω επαρχίες ανατολικά της οροσειράς των Άνδεων σε υψόμετρο <2300μ: Μορόνα-Σαντιάγο (Morona-Santiago), Νάπο (Napo), Ορεγιάννα (Orellana), Παστάζα (Pastaza), Σουκούμπιος (Sucumbios) και Ζαμόρα-Τσιντσιπέ (Zamora-Chinchipe).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι στη Βραζιλία, στη Δημοκρατία του Κονγκό, ή στην Ουγκάντα και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο των χωρών που προαναφέρονται.
		Συνήθως δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που η παραμονή τους περιορίζεται σε υψόμετρο <2300μ δυτικά της οροσειράς Άνδεων : Εσμεράλδας (Esmeraldas), Γουάγιας (Guayas), Λος Ρίος (Los Rios), Σάντα Έλενα (Santa Elena), Σάντο Δομίγκο δε λος Τσατσιλάς (Santo Domingo de los Tsachilas), και σε συγκεκριμένες περιοχές των: Ασουάι (Azuary), Μπολιβάρ (Bolivar), Κανιάρ (Canar), Κάρτσι (Carchi), Τσιμποράσο (Chimborazo), Κοτοπάξι (Cotopaxi), Ελ Όρο (El Oro), Ιμπαμπούρα (Imbabura), Λόχα (Loja), Πιτσίντσα (Pichincha) και Τουνγκουράουα (Tungurahua).	
		Δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται μόνο περιοχές σε υψόμετρο >2300μ, τις πόλεις	

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
		Γουαγιακίλ (Guayaquil) και Κίτο (Quito) ή τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos Islands).	
Ελβετία (Switzerland)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Ελλάδα (Greece)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Ελ-Σαλβαδόρ (El Salvador)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ερυθραία (Eritrea)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, μηνιγγίτιδας	Συνήθως δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις περιοχές: Ανσέμπα (Anseba), Ντεμπούμπ (Debub), Γκάς Μπάρκα (Gash Barka), Μάε Κελ (Mae Kel), Σεμενάουι Κει Μπαρι (Semenawi Keih Bahri). Δεν συνιστάται στις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω και στο αρχιπέλαγος Νταλάκ (Dahlack).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Εσθονία (Estonia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Εσουατίνι (Eswatini / Swaziland)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ζάμπια (Zambia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, χολέρας	Συνήθως δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις Βορειοδυτικές και Δυτικές Επαρχίες (North West, Western Provinces). Δεν συνιστάται στις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ζιμπάμπουε (Zimbabwe)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, χολέρας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (United Arab Emirates)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (United States of America)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Ηνωμένο Βασίλειο και τα νησιά Τσάνελ και Μαν (United Kingdom, Channel Islands, Isle of Man)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Ιαπωνία (Japan)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, ιαπωνική εγκεφαλίτιδα	Όχι	Όχι
Ινδία (India)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, χολέρας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Όλοι οι ταξιδιώτες (με εξαίρεση τα βρέφη <9 μηνών) που φθάνουν με αεροπλάνο ή πλοίο χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού απομονώνονται έως και 6 ημέρες αν : 1) αναχώρησαν από περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού τις προηγούμενες 6 ημέρες, 2) βρέθηκαν σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού για μετεπιβίβαση (transit)(εξαιρούνται οι ταξιδιώτες και τα μέλη του πληρώματος που κατά τη μετεπιβίβασή τους παρέμειναν στους χώρους του αεροδρομίου και ο υγειονομικός υπεύθυνος συμφωνεί να εξαιρεθούν), 3) φθάνουν με πλοίο που ξεκίνησε ή έκανε στάση σε λιμάνι περιοχής όπου υπάρχει

Χώρα	Εμβόλια	
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού
		Συνιστάται
		κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού, έως 30 μέρες πριν την άφιξη στην Ινδία, εκτός αν στο πλοίο έγινε απεντόμωση βάσει των οδηγιών του ΠΟΥ, ή
		4) φθάνουν με αεροσκάφος που αναχώρησε από περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και δεν έγινε απεντόμωση σύμφωνα με τις οδηγίες των Indian Aircraft Public Health Rules (1954) ή του ΠΟΥ.
		Χώρες και περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Αφρική: Ανγκόλα (Angola), Μπενίν (Bénin), Μπουρκίνα Φάσο (Burkina Faso), Μπουρουντί (Burundi), Καμερούν (Cameroon), Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (Central African Republic), Τσάντ (Chad), Κόνγκο (Congo), Ακτή Ελεφαντοστού (Côte d'Ivoire), Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Democratic Republic of the Congo), Ισημερινή Γουινέα (Equatorial Guinea), Αιθιοπία (Ethiopia), Γκαμπόν (Gabon), Γκάμπια (Gambia), Γκάνα (Ghana), Γουινέα (Guinea), Γουινέα Μπισσό (Guinea-Bissau), Κένυα (Kenya), Λιβερία (Liberia), Μάλι (Mali), Μαυριτανία (Mauritania), Νίγηρας (Niger), Νιγηρία (Nigeria), Ρουάντα (Rwanda), Σενεγάλη (Senegal), Σιέρρα Λεόνε (Sierra Leone), Νότιο Σουδάν (South Sudan), Σουδάν (Sudan), Τόγκο (Togo), Ουγκάντα (Uganda). Αμερική: Αργεντινή (Argentina), Βολιβία

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
			(Bolivia), Βραζιλία (Brazil), Κολομβία (Colombia), Εκουαδόρ (Ecuador), Γαλλική Γουιάνα (French Guiana), Γουιανά (Guyana), Παναμά (Panama), Παραγουάη (Paraguay), Περού (Peru), Σουρινάμ (Suriname), Τρινιντάντ και Τομπάγκο, μόνο Τρινιντάντ (Trinidad/Tobago) και Βενεζουέλα (Venezuela). Σημείωση: Όταν αναφερθεί ένα κρούσμα κίτρινου πυρετού σε μια χώρα, αυτή θεωρείται από την Ινδική Κυβέρνηση ως χώρα με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού και προστίθεται στην παραπάνω λίστα.
Ινδονησία (Indonesia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ιορδανία (Jordan)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ιράκ (Iraq)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, χολέρας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
			κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ιράν (Iran)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ιρλανδία (Ireland)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Ισημερινή Γουϊνέα (Equatorial Guinea)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ισλανδία (Iceland)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Ισπανία (Spain)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Ισραήλ (Israel)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, λύσσας, τυφοειδούς πυρετού	Όχι	Όχι
Ιταλία, Βατικανό (Italy, Holy See)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B,	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
	λύσσας		
Καζακστάν (Kazakhstan)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Καμερούν (Cameroon)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, μηνιγγίτιδα, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους.
Καμπότζη (Cambodia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Καναδάς (Canada)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Κανάρια Νησιά, Ισπανία (Canary Islands, Spain)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Κατάρ (Qatar)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Καϋμαν Νήσια, Ηνωμένο Βασίλειο (Cayman, UK)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Κένυα (Kenya)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, μηνιγγίτιδας, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών. Συνήθως δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που θα επισκεφθούν μόνο: την Βόρεια Ανατολική Επαρχία (North Eastern Province), τις περιοχές Κιλίφι (Kilifi), Κουάλε (Kwale), Λαμού (Lamu), Μαλίντι (Malindi) και Ποταμός Τάνα (Tanariver) στην Επαρχία Ακτή (Coastal), και τις πόλεις Μομπάσα (Mombasa) και Ναϊρόμπι (Nairobi).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Κίνα (China)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Δεν απαιτείται από τους ταξιδιώτες που θα επισκεφθούν μόνο την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κόνγκ (Hong Kong Special Administrative Region) και το Μακάο (Macao).

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Κιργιστάν (Kyrgyzstan)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Κιριμπάτι-πρώην νησιά Γκίλμπερτ, Ταράουα, Ταμπουαεράν-νησιά Φάνινγκ, Μπανάμπα- νησιά Όσεαν (Kiribati-Gilbert Islands, Tarawa, Tabuaeran-Fanning Island, Banaba-Ocean Island)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Κόκος (Κήλινγκ) Νησιά, Αυστραλία (Cocos-Keeling Islands, Australia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos) στο Εκουαδόρ (Ecuador).

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Κολομβία (Colombia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών. Συνήθως δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που θα επισκεφθούν τις πόλεις Μπαρρανκίγια (Barranquilla), Κάλι (Cali), Καρταχένα (Cartagena) και Μεδεγίν (Medellín). Δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που θα επισκεφθούν περιοχές με υψόμετρο >2300μ, στην περιοχή Σαν Αντρές και Προβιδένσια και στη Μπογκοτά (Bogotá).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι στην Ανγκόλα, στη Βραζιλία, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή στην Ουγκάντα και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες σε αεροδρόμιο των παραπάνω χωρών.
Κομόρες (Comoros)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Κόσοβο (Kosovo)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Κόστα Ρίκα (Costa Rica)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Εξαιρείται η Αργεντινή (Argentina) και ο Παναμάς (Panama). Συμπεριλαμβάνεται η Τανζανία (Tanzania), η Ζάμπια (Zambia) και συγκεκριμένες περιοχές των παρακάτω χωρών : Κολομβία (Colombia) - όλη η χώρα με εξαίρεση τις Μπαρρανκίγια (Barranquilla), Κάλι (Cali), Καρταχένα (Cartagena) και Μεδεγίν

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
			(Medellín), Σαν Αντρές Προβιδένσια (San Andrés Providencia) και Μπογκοτά (Bogotá), Εκουαδόρ (Ecuador) - μόνο οι περιοχές Μορόνα-Σαντιάγο (Morona-Santiago), Νάπο (Napo), Ορεγιάννα (Orellana), Παστάζα (Pastaza), Σουκούμπιος (Sucumbios) και Ζαμόρα-Τσιντσιπε (Zamora-Chinchipe), εξαιρείται η υπόλοιπη χώρα, Παραγουάη (Paraguay) - όλη η χώρα με εξαίρεση την πρωτεύουσα Ασυνσιόν (Asunción), Περού (Peru) - όλη η χώρα με εξαίρεση την πρωτεύουσα Λίμα (Lima), Κούσκο (Cuzco), Μάτσου Πίτσου (Machu Picchu), το μονοπάτι των Ίνκας (Inca Trail), Λαμπαγιέκε (Lambayeque), Τουμπές (Tumbes), Πιούρα (Piura) και Καχαμάρκα (Cajamarca), Τρινιντάντ και Τομπάγκο (Trinidad and Tobago) - όλη η χώρα με εξαίρεση των αστικών περιοχών του Πορτ οφ Σπείν (Port of Spain), και ταξιδιώτες που έκαναν μετεπιβίβαση ή το δρομολόγιό τους περιορίζεται στο Τομπάγκο.
Κούβα (Cuba)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Κουβέιτ (Kuwait)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Κουκ Νησιά, Νέα Ζηλανδία (Cook Islands, New Zealand)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Κουρασάο	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Κροατία (Croatia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Κύπρος (Cyprus)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό-Κινσάσα (Democratic Republic of the Congo-Kinshasa)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.
Λάος (Laos)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR,	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
	πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας		
Λεσότο (Lesotho)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Λετονία (Latvia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Λευκορωσία (Belarus)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Λίβανος (Lebanon)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Λιβερία (Liberia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Λιβύη (Libya)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Λιθουανία (Lithuania)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Λιχτενστάϊν (Liechtenstein)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Λουξεμβούργο (Luxembourg)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Μαγιότ, Γαλλία (Mayotte)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μαδαγασκάρη (Madagascar)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Μαδέιρα Νησιά, Πορτογαλία (Madeira Islands, Portugal)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Μακάο-Κίνα (Macau SAR-China)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Μαλαισία (Malaysia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, χολέρας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μαλάουι (Malawi)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, χολέρας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μαλδίβες (Maldives)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Μάλι (Mali)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδής, ηπατίτιδας B, λύσσα, μηνιγγίτιδα	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που η παραμονή τους περιορίζεται στην έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.
Μάλτα (Malta)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, λύσσα	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Αν υπάρχουν επιδημιολογικές ενδείξεις, τα παιδιά <9 μηνών που φθάνουν από περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού ενδέχεται να χρειαστούν απομόνωση ή επιτήρηση.
Μαρόκο (Morocco)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Μάρσαλ Νησιά (Marshall Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, MMR- απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού από τους ταξιδιώτες που γεννήθηκαν από το 1957 και μετά, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Μαρτινίκα, Γαλλία (Martinique)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μαυρίκιος (Mauritius)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Μαυριτανία (Mauritania)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που το ταξίδι τους περιορίζεται στην έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μαυροβούνιο (Montenegro)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Μεξικό (Mexico)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Μικρονησία - νησιά Γιαπ, Πονπέϊ, Τσουκ, Κοσράε (Federated States of Micronesia - Yap)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Islands, Pohnpei, Chuuk, Kosrae)			
Μογγολία (Mongolia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Μοζαμβίκη (Mozambique)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, χολέρας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μολδαβία (Moldova)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Μονακό (Monaco)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Μονσερά, Ηνωμένο Βασίλειο (Montserrat, UK)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Μπαγκλαντές (Bangladesh)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, χολέρας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μπαρμπάντος Νησιά (Barbados)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Εξαιρείται η Γουιάνα (Guyana) και το Τρινάντ και Τομπάγκο (Trinidad, Tobago), εκτός αν υπάρχει επιδημία σε εξέλιξη.
Μπαχάμες (Bahamas)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μπαχρέιν (Bahrain)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μπελιζ (Belize)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
			κίτρινου πυρετού.
Μπενίν (Benin)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, μηνιγγίτιδας, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.
Μποναίρ (Bonaire)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μποτσουάνα (Botswana)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μπουρκίνα Φάσο (Burkina Faso)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.
Μπουρουντι (Burundi)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Μπουτάν (Bhutan)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Όχι
Μπρούνεϊ (Brunei)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ναμίμπια (Namibia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ναούρου Νησιά (Nauru)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Νέα Ζηλανδία (New Zealand)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Νέα Καληδονία-Γαλλία (New Caledonia-France)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Μπορεί να απαιτηθεί πιστοποιητικό εμβολιασμού αν υπάρχει επιδημία σε εξέλιξη.
Νεπάλ (Nepal)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Νησί του Πάσχα-Χιλή (Easter Island)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Δεν έχει δηλώσει απαιτήσεις για το πιστοποιητικό εμβολιασμού κίτρινου πυρετού.
Νησιά των Χριστουγέννων, Αυστραλία (Christmas Island, Australia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos) στο Εκουαδór.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Νιγηρας (Niger)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, μηνιγγίτιδας, χολέρας	Συνιστάται σε ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που η παραμονή τους περιορίζεται στην έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.
Νιγηρία (Nigeria)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, μηνιγγίτιδας, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.
Νικαράγουα (Nicaragua)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Νιου- Νέα Ζηλανδία (Niue)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Νορβηγία (Norway)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Νόρφολκ Νησι-Αυστραλία (Norfolk Island)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού. Εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos) στο

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
			Εκουαδór.
Νότια Αφρική (South Africa)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Νότια Γεωργία και Νότια Σάντουιτς Νησιά (South Georgia & South Sandwich Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Δεν έχει δηλώσει απαιτήσεις για το πιστοποιητικό εμβολιασμού κίτρινου πυρετού.
Νότια Κορέα (South Korea)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Όχι
Νότιο Σουδάν	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, μηνιγγίτιδας, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών.
Ολλανδία (Netherlands)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ομάν (Oman)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) > 12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ονδούρα (Honduras)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ουγγαρία (Hungary)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Ουγκάντα (Uganda)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, μηνιγγίτιδας, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους.
Ουζμπεκιστάν (Uzbekistan)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Ουκρανία (Ukraine)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Ουρουγουάη (Uruguay)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς,	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
	γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας		
Πακιστάν (Pakistan)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Παλάου Νησιά (Palau)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Παναμάς (Panama)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται όλες τις ηπειρωτικές περιοχές ανατολικά της Διώρυγας, τις επαρχίες Ντάριεν (Darién) και Εμπερά (Emberá) και Γκούνα Γιάλα (Kuna Yala), και τις επαρχίες Κολόν (Colón) και Παναμά (Panamá) που βρίσκονται ανατολικά της Διώρυγας. Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που επισκέπτονται μόνο περιοχές δυτικά της Διώρυγας, την πόλη του Παναμά, την περιοχή της Διώρυγας, και τα νησιά Μπαλμπόα (Pearl Islands) και Σαν Μπλας (San Blas).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Παπούα Νέα Γουινέα (Papua New Guinea)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Παραγουάη (Paraguay)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών. Συνήθως δεν συνιστάται σε εκείνους που επισκέπτονται μόνο την πόλη Ασουνσιόν (Asunción).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Παρθένοι Νήσοι, ΗΠΑ (Virgin Islands, US)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Παρθένοι Νήσοι, Μεγάλη Βρετανία (Virgin Islands, British)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Περού	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές με υψόμετρο $< 2300\mu$ στις περιοχές Αμαζόνας (Amazonas), Λορέτο (Loreto), Μάδρε ντε Ντιός (Madre de Dios), Σαν Μαρτίν (San Martin), Ουκαγιαλί (Ucayali), Πούνο (Puno), Κούσκο (Cusco), Χουνίν (Junín), Πάσκο (Pasco), και Χουανούκο (Huánuco) και συγκεκριμένες περιοχές των επαρχιών: βόρειο Απουριμάκ (Apurímac),	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
		<p>βορειοανατολικό Άνκας (Ancash), βόρειο και βορειοανατολικό Αγιακούτσο (Ayacucho), βόρεια και ανατολική Καχαμάρκα (Cajamarca), βόρεια Ουανκαβελίκα (Huancavelica), ανατολική Λα Λιμπερτάδ (La Libertad) και ανατολική Πιούρα (Piura).</p> <p>Συνήθως δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις παρακάτω περιοχές δυτικά των Άνδεων (Andes): περιοχές Λαμπαγέκε (Lambayeque) και Τουμπές (Tumbes) και συγκεκριμένες περιοχές στη δυτική Πιούρα (Piura), και στη νότια, κεντρική και δυτική Καχαμάρκα (Cajamarca). Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που το ταξίδι τους περιορίζεται στις παρακάτω περιοχές : όλες οι περιοχές με υψόμετρο >2300μ, στις περιοχές δυτικά των Άνδεων που δεν αναφέρονται παραπάνω, στις πόλεις Κούσκο (Cuzco) και Λίμα (Lima), στο Μάτσου Πίτσου (Machu Picchu) και στο μονοπάτι των Ίνκας (Inca Trail).</p>	
Πίτκαιρν Νησιά, Ηνωμένο Βασίλειο (Pitcairn Islands, UK)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμυλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Πολωνία (Poland)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Πορτογαλία (Portugal)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Πουέρτο Ρίκο (Puerto Rico)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Πράσινο Ακρωτήρι (Cape Verde)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ρεουνιόν, Γαλλία (Réunion)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Ρουάντα (Rwanda)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Συνήθως δεν συνιστάται	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Ρουμανία (Romania)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ρωσία (Russia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, εγκεφαλίτιδα από κρότωνα	Όχι	Όχι
Σαμόα (Samoa) - πρώην Δυτική Σαμόα (Western Samoa)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Σάμπα	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Σαν Μαρίνο (San Marino)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (Sao Tomé & Principe)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Συνήθως δεν συνιστάται	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Σαουδική Αραβία (Saudi Arabia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας,	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit)

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
	μηνιγγίτιδας		>12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Σενεγάλη (Senegal)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Σερβία (Serbia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Σεϋχέλλες (Seychelles)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Σιγκαπούρη (Singapore)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Σιέρα Λεόνε (Sierra Leone)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες.
Σλοβακία (Slovakia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Σλοβενία (Slovenia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Σολωμόντα Νησιά (Solomon Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Σομαλία (Somalia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, χολέρας	Συνήθως δε συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις περιοχές: Μπακόλ (Bakool), Μπαναντίρ (Banaadir), Μπέυ (Bay), Γγάλγκουντουντ (Galguduud), Γκέντα (Gedo), Ιράν (Hiiraan), Κάτω και Μέση Τζούμπα (Lower/Middle Juba), Κάτω και Μέση Σαβέλε (Lower/ Middle Shabelle). Δεν συνιστάται στις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Σουδάν (Sudan)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, μηνιγγίτιδας, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που το ταξίδι τους περιορίζεται στην έρημο Σαχάρα και στην πόλη Χαρτούμ (Khartoum).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Σουηδία (Sweden)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Σουρινάμ (Surinam)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Σρι Λάνκα (Sri Lanka)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Συρία (Syria)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Ταϊβάν (Taiwan)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Τανζανία, Ζανζιβάρη (Tanzania, Zanzibar)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, χολέρας	Συνήθως δεν συνιστάται	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Τατζικιστάν (Tajikistan)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Ταϊλάνδη (Thailand)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, χολέρας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Τερκς και Κέικος Νησιά (Turks & Caicos Islands, UK)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Τζαμαϊκά (Jamaica)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Τζιμπουτί (Djibuti)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Τόγκο (Togo)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους.
Τοκελάου (Tokelau)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Τόνγκα (Tonga)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Τουβαλού (Tuvalu)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Τουρκία (Turkey)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Τουρκμενιστάν (Turkmenistan)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
	πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας		
Τρινιντάντ και Τομπάγκο (Trinidad & Tobago)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές με πυκνά δάση στο νησί Τρινιντάντ (Trinidad). Δεν συνιστάται στους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων και στους επιβάτες αεροπλάνων σε μετεπιβίβαση (transit) ή στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται μόνο το νησί Τομπάγκο (Tobago).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Τσαντ (Chad)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας μηνιγγίτιδας, χολέρας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται περιοχές μόνο στην έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Τσεχία (Czech Republic)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Τυνησία (Tunisia)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Υεμένη (Yemen)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, χολέρας	Όχι	Όχι
Φερόες Νησιά, Δανία (Faroe Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Φιλιππίνες (Philippines)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B, λύσσας, χολέρας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Φινλανδία (Finland)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Φίτζι Νησιά (Fiji)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε χώρα όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κίτρινου πυρετού και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Φώκλαντ Νησιά (Falkland Islands / Islas Malvinas)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Χιλή (Chile)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Χόνγκ Κονγκ- Κίνα (Hong Kong SAR, China)	τετάνου-διφθερίτιδας, MMR, πολιομυελίτιδας, ανεμευλογιάς, γρίπης, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι

*Παρατηρήσεις σχετικά με τα συνιστώμενα εμβόλια

Συνιστάται όλοι οι ταξιδιώτες πριν το ταξίδι να έχουν τον εμβολιασμό τους επικαιροποιημένο σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού της Ελλάδας.

- 1. Εμβόλιο τετάνου – διφθερίτιδας.** Συστήνεται αναμνηστική δόση σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια.
- 2. Εμβόλιο πολιομυελίτιδας.** Συνιστάται οι ταξιδιώτες προς περιοχές υψηλού κινδύνου για κυκλοφορία του ιού της πολιομυελίτιδας (όπως ενδημικές περιοχές, επιδημία πολιομυελίτιδας ή περιβαλλοντικές ενδείξεις κυκλοφορίας του ιού) να είναι πλήρως εμβολιασμένοι για την ηλικία τους, σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. Οι ενήλικες που είχαν εμβολιασθεί με 3 ή περισσότερες δόσεις στην παιδική ηλικία συστήνεται να κάνουν μία αναμνηστική δόση εφ' άπαξ για όλη την ενήλικη ζωή. Επίσης, αναμνηστική δόση συνιστάται στους ενήλικες που ταξιδεύουν προς περιοχές που συνορεύουν με περιοχές υψηλού κινδύνου για κυκλοφορία του ιού της πολιομυελίτιδας.
- 3. Εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (MMR).** Συστήνεται σε όσους δεν έχουν χορηγηθεί 2 δόσεις ή δεν έχουν νοσήσει από τη νόσο.
- 4. Εμβόλιο ηπατίτιδας Α.** Συστήνεται σε ταξιδιώτες χωρίς ανοσία που ταξιδεύουν σε χώρες μέσης ή υψηλής ενδημικότητας για ηπατίτιδα Α. Οι ταξιδιώτες μπορούν να προσβληθούν από ηπατίτιδα Α ακόμη και όταν παραμένουν σε πολυτελή ξενοδοχεία.
- 5. Εμβόλιο ηπατίτιδας Β.** Συστήνεται αν ο κίνδυνος έκθεσης σε αιματογενώς ή σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα είναι υψηλός ή αν η παραμονή στην περιοχή είναι μεγαλύτερη των 6 μηνών.
- 6. Το εμβόλιο γρίπης,** συστήνεται σε ταξιδιώτες που εκτιμώνται ως υψηλού κινδύνου και κυρίως κατά τη διάρκεια της εποχικής γρίπης (χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο, καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο).
- 7. Εμβόλιο τυφοειδούς πυρετού.** Συστήνεται σε όσους πρόκειται να εκτεθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μολυσμένο νερό ή φαγητό και ιδιαίτερα αν ταξιδέψουν σε μικρότερες πόλεις, χωριά ή αγροτικές περιοχές με χαμηλού επιπέδου υγειονομικές συνθήκες.
- 8. Εμβόλιο λύσσας.** Συστήνεται αν πρόκειται να εκτεθεί κανείς σε άγρια ή κατοικίδια ζώα για λόγους επαγγελματικούς ή αναψυχής.
- 9. Εμβόλιο μηνιγγίτιδας.** Συνιστάται το τετραδύναμο εμβόλιο σε όλους τους ταξιδιώτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σε ενδημικές περιοχές όπως οι χώρες της Αφρικής που βρίσκονται εντός της «ζώνης της μηνιγγίτιδας». Η Σαουδική Αραβία απαιτεί πιστοποιητικό εμβολιασμού για να επιτρέψει την είσοδο στους ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος στη Μέκκα. Η αναγκαιότητα εμβολιασμού αυξάνει κατά την περίοδο της ξηρασίας και στην περίπτωση που οι ταξιδιώτες πρόκειται να συναναστραφούν στενά με κατοίκους της περιοχής ή να παραμείνουν πάνω από 1 μήνα ή αν κάνουν συχνά ταξίδια σ' αυτές τις περιοχές.
- 10. Εμβόλιο ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας.** Συστήνεται αν πρόκειται να επισκεφτεί κανείς αγροτικές περιοχές για χρονικό διάστημα άνω των τεσσάρων εβδομάδων ή εάν στον τόπο προορισμού υπάρχει γνωστή επιδημία ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας (το εμβόλιο της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας δεν κυκλοφορεί προς το παρόν στην Ελλάδα).

11. Εμβόλιο εγκεφαλίτιδας από κρότωνες. Ο κίνδυνος για τον ταξιδιώτη είναι πολύ μικρός, αλλά αυξάνεται ανάλογα με την εποχή και το είδος του ταξιδιού. Το εμβόλιο συστήνεται στους ταξιδιώτες μόνο αν πρόκειται να παραμείνουν αρκετές ώρες σε δάσος σε ενδημικές περιοχές, π.χ. κατασκηνωτές ή κυνηγοί, και εφόσον το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού.

Βιβλιογραφία

1. International Travel and Health. World Health Organization (WHO). Στο: <http://www.who.int/ith/>
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Travelers' Health. Στο: <http://www.cdc.gov/travel/>