

**Neisseria spp**

EUCAST, v 12.0, 2022

<b>Neisseria gonorrhoeae</b>				
Αντιβιοτικό	MIC (mg/L)			Μόνο MICs. Ο προσδιορισμός γίνεται με κάποιο σύστημα του εμπορίου (π.χ ταινίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης) με βάση τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας
	S≤	R>	ATU	
<b>Benzylpenicillin, ως υποκατάστατο αντιβιοτικό</b>	<b>0.06</b>	<b>1</b>		Ελέγχεται πάντα η παραγωγή β-λακταμάσης & εάν είναι θετική αναφέρω αντοχή σε Ampicillin και Amoxicillin. Εάν η β-λακταμάση είναι αρνητική, προσδιορίζεται η MIC σε Benzylpenicillin και από αυτή συνεπάγεται η ευαισθησία σε Ampicillin και Amoxicillin. Δεν αναφέρεται η ευαισθησία σε Benzylpenicillin.
<b>Cefotaxime</b>	<b>0.125</b>	<b>0.125</b>		
<b>Ceftriaxone</b>	<b>0.125</b>	<b>0.125</b>		
<b>Cefixime</b>	<b>0.125</b>	<b>0.125</b>		
<b>Ciprofloxacin</b>	<b>0.03</b>	<b>0.06</b>		
<b>Spectinomycin</b>	<b>64</b>	<b>64</b>		
<b>Neisseria meningitidis</b>				
Αντιβιοτικό	MIC (mg/L)			Μόνο MICs. Ο προσδιορισμός γίνεται με κάποιο σύστημα του εμπορίου (π.χ ταινίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης) με βάση τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας
	S≤	R>	ATU	
<b>Benzylpenicillin</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>		Αφορούν σε ΕΦ χορήγηση
<b>Ampicillin, Amoxicillin</b>	<b>0.125</b>	<b>1</b>		
<b>Ampicillin, Amoxicillin</b>	<b>IE</b>	<b>IE</b>		<b>ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ</b>
<b>Ceftriaxone<sup>1</sup></b>	<b>0.125</b>	<b>0.125</b>		1. Μη ευαίσθητα στελέχη είναι σπάνια ή δεν έχουν αναφερθεί. Σε περίπτωση μη ευαίσθητου στελέχους, να επιβεβαιώνεται η ταυτοποίηση και η ευαισθησία και να αποστέλλεται στο ΕΚΑΜ. Η Ceftriaxone μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για προφύλαξη.
<b>Cefotaxime<sup>1</sup></b>	<b>0.125</b>	<b>0.125</b>		
<b>Meropenem<sup>1</sup></b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>		
<b>Ciprofloxacin</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>		Για χημειοπροφύλαξη
<b>Rifampicin</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>		Για χημειοπροφύλαξη

